

Patientguide

LIBTAYO[®] ▼

(cemiplimab)

Viktig säkerhetsinformation för att minimera komplikationerna av immunmedierade biverkningar

Denna Patientguide är till för att hjälpa dig att känna igen och rapportera biverkningar som hör ihop med din behandling med LIBTAYO[®] (cemiplimab).

Detaljerad information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se. För ytterligare information, läs bipacksedeln på www.fass.se eller kontakta Regeneron avdelning för medicinsk information 020 1604 786 eller medical.information_global@regeneron.com

Viktig information

- Berätta för din läkare om alla dina sjukdomstillstånd och alla läkemedel som du använder innan du tar LIBTAYO.
- LIBTAYO kan orsaka allvarliga biverkningar som kan förvärras.
- Rapportera alla biverkningar till din läkare, även om de inte finns nämnda i denna Patientguide.
- Vänta inte med att rapportera biverkningar till din läkare, även om du är bortrest.
- Försök inte behandla dessa biverkningar själv utan att först konsultera din läkare.
- Ha alltid med dig Patientvarningskortet under behandlingstiden.
- Visa Patientvarningskortet för all Hälso- och sjukvårdspersonal du besöker, utöver läkaren som förskrev LIBTAYO åt dig.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.

Uppsök omedelbart akut sjukvård om du får någon av dessa biverkningar, eller om de förvärras:

Hudproblem

- Utslag eller klåda
- Spruckna blåsor på huden
- Sår i munnen eller sår i andra slemhinnor

Problem med lungorna (lunginflammation)

- Ny eller förvärrad hosta
- Andningssvårigheter
- Bröstmärta

Inflammation i tarmarna (kolit)

- Frekvent diarré ofta blod- eller slemblandad
- Fler avföringar än vanligt
- Svart eller tjärliknande avföring
- Kraftig magsmärta eller ömmande mage

Inflammation i levern (hepatit)

- Gulfärgning av hud eller ögonvitor
- Kraftigt illamående eller kräkningar
- Smärta på höger sida av magen (i tarmarna)
- Trötthet
- Mörkfärgad urin (tefärgad)
- Lättare att få blåmärken eller blödning än vanligt
- Mindre aptit än vanligt

Problem i hormonproducerande körtlar

- Huvudvärk som inte försvinner eller ovanlig huvudvärk
- Snabba hjärtslag
- Ökad svettning
- Mer frusen eller varm än vanligt
- Kraftig trötthet

- Yrsel eller svimning
- Viktökning eller viktnedgång
- Ökad hunger eller törst
- Håravfall
- Förstoppning
- Mörkare röst
- Mycket lågt blodtryck
- Behov av att kissa oftare
- Illamående eller kräkningar
- Magsmärta (buksmärta)
- Ändrad sinnesstämning eller beteende (såsom minskad sexuell lust, vara irriterad eller glömsk)

Symtom vid diabetes typ 1 eller diabetesketoacidosis

- Ökad aptit eller överdriven törst
- Behov av att kissa oftare
- Viktnedgång
- Trötthetskänsla eller illamående
- Magsmärta
- Snabb och djup andning
- Förvirring
- Ovanlig sömnighet
- Sötaktig andedräkt, en söt eller metallisk smak i munnen eller annorlunda lukt på urin eller svett

Problem med njurarna (njurinflammation och njursvikt)

- Behov av att kissa mer sällan än vanligt
- Blodblandad urin
- Svullna fötter eller underben
- Minskad aptit

Reaktioner i samband med infusion (kan vara allvarliga eller livshotande)

- Frossa
- Skakningar eller feber
- Klåda eller utslag
- Rodnad eller svullet ansikte
- Andningssvårigheter eller väsande andning
- Yrsel eller svimningskänsla
- Smärta i rygg eller nacke
- Illamående
- Kräkningar
- Buksmärta

Problem i andra delar av kroppen

- Problem i nervsystemet
 - Huvudvärk eller nackstelhet
 - Feber
 - Trötthetskänsla eller svaghet
 - Frossa
 - Kräkningar
 - Förvirring
 - Problem med minnet eller trötthetskänsla
 - Ryckningar (krampanfall)
 - Se och höra saker som inte är verkliga (hallucinationer)
 - Kraftig muskelsvaghet
 - Stickningar, domningar, svaghet eller brännande smärta i armar eller ben
 - Förflamning i extremiteterna

- **Muskel- och ledproblem**

- Ledvärk eller svullnad
- Muskelsmärta, svaghet eller stelhet

- **Ögonproblem**

- Synförändringar
- Ögonsmärta eller röda ögon
- Ljuskänslighet

- **Hjärt- och cirkulationsproblem**

- Ändrade hjärtslag, snabba hjärtslag, känsla av att hjärtat hoppar över ett hjärtslag eller en dunkande känsla
- Bröstmärta
- Andnöd

- **Övrigt**

- Torrhet på flera ställen på kroppen såsom muntorrhet, torra ögon, torr i näsan, halsen och torr hud
- Blåmärken på huden eller blödning, förstörd lever och/eller mjälte, lymfkörtelförstoring



Viktig kontaktinformation

Läkarens namn _____

Läkarens telefonnummer _____

Mitt namn _____

Mitt telefonnummer _____

Min kontaktperson vid nödsituationer _____

Telefonnummer till min kontaktperson vid nödsituationer _____

REGENERON

© 2024 Regeneron Ireland DAC. All rights reserved.
Utbildningsmaterial, ND-CEM-MI-24-02-0005, Version 1,
03/2024.

