

Detta påminnelsekort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till före och under behandling med injektioner av zoledronsyra (Zoledronic Acid Mylan) för cancerrelaterade tillstånd.

Din läkare har rekommenderat att du ska få injektioner med zoledronsyra (Zoledronic Acid Mylan) för att förebygga skelett-komplikationer (t.ex. frakturer) orsakade av skelettmetastaser eller skelettcancer, eller för att sänka halten av kalcium i blodet hos vuxna patienter där en tumör gör att den är för hög, så kallad tumörinducerad hyperkalcemi (TIH).

En mindre vanlig biverkning som kallas osteonekros i käken (ONJ) (benskada i käken) har rapporterats hos patienter som får injektioner med zoledronsyra för cancerrelaterade tillstånd. ONJ kan även uppträda efter avslutad behandling.

För att minska risken att utveckla osteonekros i käken, finns det några försiktighetsåtgärder som du bör vidta:

Före behandlingsstart;

- Be din läkare att berätta om ONJ för dig innan du börjar med behandlingen.
- Fråga din läkare om du bör genomgå en tandundersökning innan du påbörjar behandlingen med zoledronsyra (Zoledronic Acid Mylan).
- Tala om för din läkare/sjuksköterska (vårdpersonal) om du har några problem med din mun eller dina tänder.

Patienter som genomgår tandkirurgi (t.ex. utdragning av tand), som inte går på regelbundna tandkontroller eller patienter som har en sjukdom i tandköttet, som röker, som får olika typer av cancerbehandlingar eller som tidigare har behandlats med ett bisfosfonat (används för att behandla eller förebygga skelettsjukdom) kan löpa högre risk att utveckla ONJ.

Under behandlingen:

- Du bör vara noga med munhygienen, se till att eventuella proteser har god passform och gå på regelbundna tandkontroller.
- Om du genomgår tandbehandling eller ska genomgå tandkirurgi (t.ex. utdragning av tand) ska du informera din läkare och tala om för din tandläkare att du behandlas med zoledronsyra (Zoledronic Acid Mylan).
- Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du får några problem med munnen eller tänderna, såsom en lös tand, smärta eller svullnad, sår som inte läker eller som vätskar sig, eftersom detta kan vara tecken på osteonekros i käken.

Läs bipackssedeln för mer information.