

Absenor® orala droppar 200 mg/ml*

Absenor® oral lösning 60 mg/ml*

Doseringshjälpmedel - Doseringsspruta 1 ml och 10 ml

Till Absenor® oral lösning och orala droppar ska en doseringsanordning användas, såsom en spruta som möjliggör tillräcklig noggrannhet för korrekt dosering.

Den speciellt framtagna doseringssprutan med tillhörande skruvkork säkerställer att;

- Det alltid blir korrekt dos
- Det inte läcker ut läkemedel mellan flaska, kork och doseringsspruta

Doseringsprutorna i 1 ml och/eller 10 ml ska ordineras på receptet tillsammans med Absenor® oral lösning och/eller droppar.

Vilken doseringsspruta, 1 ml och/eller 10 ml, som ska tillhandahållas beror på vilken dos i milliliter som ordineras. Som hjälpmedel för val av lämplig doseringsspruta vänligen se doseringstabell nedan.

Doseringsprutorna ska tillhandahållas kostnadsfritt till kund från apotek vid recept expediering.

Doseringsprutorna med adapter, är speciellt framtagna för att passa Absenor® flaskorna och säkerställer en korrekt dosering och minskat spill vid administration.

Av hygieniska skäl rekommenderas byte till ny doseringsspruta när en ny flaska öppnas. Doseringssprutorna beställs av apotek kostnadsfritt på nedanstående varunummer från Tamro.



Varunummer	Produktnamn	Förpackning	Pris
204679	Absenor®	Doseringspruta 1 ml	Kostnadsfri
204678	Absenor®	Doseringspruta 10 ml	Kostnadsfri

* ▼ Utökad övervakning Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Doseringstabell - Absenor® oral lösning 60 mg/ml

Dygnsdos 20-40 mg/kg kroppsvikt¹

Pediatrik population

Till barn utan annan antiepileptisk behandling ges initialt 20–40 mg/kg kroppsvikt delat på 2–3 doser i samband med måltid.

Dosen kan ökas med 3 dagars intervall (75–150 mg/dygn) till anfallsfrihet.²

Absenor oral lösning 60 mg/ml (≤ 1,5 ml är markerade i grön, vänligen använd 1 ml doseringsspruta.)													
Dygnsdosering 20 mg/kg kroppsvikt							Dygnsdosering 40 mg/kg kroppsvikt						
Vikt	Dygnsdos mg	Dygnsdos ml	Dosering 2 gr/dygn ml	Dosering 3 gr/dygn ml	Lämplig doserings-spruta		Vikt	Dygndos mg	Dygnsdos ml	Dosering 2 gr/dygn ml	Dosering 3 gr/dygn ml	Lämplig doserings-spruta	
3 kg	60	1,0	0,5	0,3	1 ml		3 kg	120	2,0	1,0	0,7	1 ml	
4 kg	80	1,3	0,7	0,4	1 ml		4 kg	160	2,7	1,3	0,9	1 ml	10 ml
5 kg	100	1,7	0,8	0,6	1 ml		5 kg	200	3,3	1,7	1,1	1 ml	10 ml
6 kg	120	2,0	1,0	0,7	1 ml		6 kg	240	4,0	2,0	1,3	1 ml	10 ml
7 kg	140	2,3	1,2	0,8	1 ml	10 ml	7 kg	280	4,7	2,3	1,6		10 ml
8 kg	160	2,7	1,3	0,9	1 ml	10 ml	8 kg	320	5,3	2,7	1,8		10 ml
9 kg	180	3,0	1,5	1,0	1 ml	10 ml	9 kg	360	6,0	3,0	2,0		10 ml
10 kg	200	3,3	1,7	1,1	1 ml	10 ml	10 kg	400	6,7	3,3	2,2		10 ml
11 kg	220	3,7	1,8	1,2	1 ml	10 ml	11 kg	440	7,3	3,7	2,4		10 ml
12 kg	240	4,0	2,0	1,3	1 ml	10 ml	12 kg	480	8,0	4,0	2,7		10 ml
13 kg	260	4,3	2,2	1,4	1 ml	10 ml	13 kg	520	8,7	4,3	2,9		10 ml
14 kg	280	4,7	2,3	1,6		10 ml	14 kg	560	9,3	4,7	3,1		10 ml
15 kg	300	5,0	2,5	1,7		10 ml	15 kg	600	10,0	5,0	3,3		10 ml
16 kg	320	5,3	2,7	1,8		10 ml	16 kg	640	10,7	5,3	3,6		10 ml
17 kg	340	5,7	2,8	1,9		10 ml	17 kg	680	11,3	5,7	3,8		10 ml
18 kg	360	6,0	3,0	2,0		10 ml	18 kg	720	12,00	6,0	4,0		10 ml
19 kg	380	6,3	3,2	2,1		10 ml	19 kg	760	12,7	6,3	4,2		10 ml
20 kg	400	6,7	3,3	2,2		10 ml	20 kg	800	13,3	6,7	4,4		10 ml
21 kg	420	7,0	3,5	2,3		10 ml	21 kg	840	14,0	7,0	4,7		10 ml
22 kg	440	7,3	3,7	2,4		10 ml	22 kg	880	14,7	7,3	4,9		10 ml
23 kg	460	7,7	3,8	2,6		10 ml	23 kg	920	15,3	7,7	5,1		10 ml
24 kg	480	8,0	4,0	2,7		10 ml	24 kg	960	16,0	8,0	5,3		10 ml
25 kg	500	8,3	4,2	2,8		10 ml	25 kg	1000	16,7	8,3	5,6		10 ml
26 kg	520	8,7	4,3	2,9		10 ml	26 kg	1040	17,3	8,7	5,8		10 ml
27 kg	540	9,0	4,5	3,0		10 ml	27 kg	1080	18,0	9,0	6,0		10 ml
28 kg	560	9,3	4,7	3,1		10 ml	28 kg	1120	18,7	9,3	6,2		10 ml
29 kg	580	9,7	4,8	3,2		10 ml	29 kg	1160	19,3	9,7	6,4		10 ml
30 kg	600	10,0	5,0	3,3		10 ml	30 kg	1200	20,0	10,0	6,7		10 ml
31 kg	620	10,3	5,2	3,4		10 ml	31 kg	1240	20,7	10,3	6,9		10 ml
32 kg	640	10,7	5,3	3,6		10 ml	32 kg	1280	21,3	10,7	7,1		10 ml
33 kg	660	11,0	5,5	3,7		10 ml	33 kg	1320	22,0	11,0	7,3		10 ml
34 kg	680	11,3	5,7	3,8		10 ml	34 kg	1360	22,7	11,3	7,6		10 ml
35 kg	700	11,7	5,8	3,9		10 ml	35 kg	1400	23,3	11,7	7,8		10 ml
36 kg	720	12,0	6,0	4,0		10 ml	36 kg	1440	24,0	12,0	8,0		10 ml
37 kg	740	12,3	6,2	4,1		10 ml	37 kg	1480	24,7	12,3	8,2		10 ml
38 kg	760	12,7	6,3	4,2		10 ml	38 kg	1520	25,3	12,7	8,4		10 ml
39 kg	780	13,0	6,5	4,3		10 ml	39 kg	1560	26,0	13,0	8,7		10 ml
40 kg	800	13,3	6,7	4,4		10 ml	40 kg	1600	26,7	13,3	8,9		10 ml
42 kg	840	14,0	7,0	4,7		10 ml	42 kg	1680	28,0	14,0	9,3		10 ml
44 kg	880	14,7	7,3	4,9		10 ml	44 kg	1760	29,3	14,7	9,8		10 ml
46 kg	920	15,3	7,7	5,1		10 ml	46 kg	1840	30,7	15,3	10,2		10 ml
48 kg	960	16,0	8,0	5,3		10 ml	48 kg	1920	32,0	16,0	10,7		10 ml
50 kg	1000	16,7	8,3	5,6		10 ml	50 kg	2000	33,3	16,7	11,1		10 ml

1) Dosering enligt FASS text för Absenor® oral lösning 60 mg/ml

2) Tabellen är baserad på intial behandling och dosen kan ökas med 3 dagars intervall (75–150 mg/dygn) till anfallsfrihet.

Doseringstabell - Absenor® oral droppar 200 mg/ml

Dygnsdos 20-40 mg/kg kroppsvikt¹

Pediatrisk population

Till barn utan annan antiepileptisk behandling ges initialt 20–40 mg/kg kroppsvikt delat på 2–3 doser i samband med måltid.

Dosen kan ökas med 3 dagars intervall (75–150 mg/dygn) till anfallsfrihet.²

Absenor Oral droppar 200 mg/ml (≤ 1,5 ml är markerade i grön, vänligen använd 1 ml doseringsspruta.)													
Dygnsdosering 20 mg/kg kroppsvikt							Dygnsdosering 40 mg/kg kroppsvikt						
Vikt	Dygnsdos mg	Dygnsdos ml	Dosering 2 gr/dygn ml	Dosering 3 gr/dygn ml	Lämplig doserings-spruta		Vikt	Dygndos mg	Dygnsdos ml	Dosering 2 gr/dygn ml	Dosering 3 gr/dygn ml	Lämplig doserings-spruta	
3 kg	60	0,3	0,2	0,1	1 ml		3 kg	120	0,6	0,3	0,2	1 ml	
4 kg	80	0,4	0,2	0,1	1 ml		4 kg	160	0,8	0,4	0,3	1 ml	
5 kg	100	0,5	0,3	0,2	1 ml		5 kg	200	1,0	0,5	0,3	1 ml	
6 kg	120	0,6	0,3	0,2	1 ml		6 kg	240	1,2	0,6	0,4	1 ml	
7 kg	140	0,7	0,4	0,2	1 ml		7 kg	280	1,4	0,7	0,5	1 ml	
8 kg	160	0,8	0,4	0,3	1 ml		8 kg	320	1,6	0,8	0,5	1 ml	
9 kg	180	0,9	0,5	0,3	1 ml		9 kg	360	1,8	0,9	0,6	1 ml	
10 kg	200	1,0	0,5	0,3	1 ml		10 kg	400	2,0	1,0	0,7	1 ml	
11 kg	220	1,1	0,6	0,4	1 ml		11 kg	440	2,2	1,1	0,7	1 ml	10 ml
12 kg	240	1,2	0,6	0,4	1 ml		12 kg	480	2,4	1,2	0,8	1 ml	10 ml
13 kg	260	1,3	0,7	0,4	1 ml		13 kg	520	2,6	1,3	0,9	1 ml	10 ml
14 kg	280	1,4	0,7	0,5	1 ml		14 kg	560	2,8	1,4	0,9	1 ml	10 ml
15 kg	300	1,5	0,8	0,5	1 ml		15 kg	600	3,0	1,5	1,0	1 ml	10 ml
16 kg	320	1,6	0,8	0,5	1 ml		16 kg	640	3,2	1,6	1,1	1 ml	10 ml
17 kg	340	1,7	0,9	0,6	1 ml		17 kg	680	3,4	1,7	1,1	1 ml	10 ml
18 kg	360	1,8	0,9	0,6	1 ml		18 kg	720	3,6	1,8	1,2	1 ml	10 ml
19 kg	380	1,9	1,0	0,6	1 ml		19 kg	760	3,8	1,9	1,3	1 ml	10 ml
20 kg	400	2,0	1,0	0,7	1 ml		20 kg	800	4,0	2,0	1,3	1 ml	10 ml
21 kg	420	2,1	1,1	0,7	1 ml	10 ml	21 kg	840	4,2	2,1	1,4	1 ml	10 ml
22 kg	440	2,2	1,1	0,7	1 ml	10 ml	22 kg	880	4,4	2,2	1,5	1 ml	10 ml
23 kg	460	2,3	1,2	0,8	1 ml	10 ml	23 kg	920	4,6	2,3	1,5	1 ml	10 ml
24 kg	480	2,4	1,2	0,8	1 ml	10 ml	24 kg	960	4,8	2,4	1,6		10 ml
25 kg	500	2,5	1,3	0,8	1 ml	10 ml	25 kg	1000	5,0	2,5	1,7		10 ml
26 kg	520	2,6	1,3	0,9	1 ml	10 ml	26 kg	1040	5,2	2,6	1,7		10 ml
27 kg	540	2,7	1,4	0,9	1 ml	10 ml	27 kg	1080	5,4	2,7	1,8		10 ml
28 kg	560	2,8	1,4	0,9	1 ml	10 ml	28 kg	1120	5,6	2,8	1,9		10 ml
29 kg	580	2,9	1,5	1,0	1 ml	10 ml	29 kg	1160	5,8	2,9	1,9		10 ml
30 kg	600	3,0	1,5	1,0	1 ml	10 ml	30 kg	1200	6,0	3,0	2,0		10 ml
31 kg	620	3,1	1,6	1,0	1 ml	10 ml	31 kg	1240	6,2	3,1	2,1		10 ml
32 kg	640	3,2	1,6	1,1	1 ml	10 ml	32 kg	1280	6,4	3,2	2,1		10 ml
33 kg	660	3,3	1,7	1,1	1 ml	10 ml	33 kg	1320	6,6	3,3	2,2		10 ml
34 kg	680	3,4	1,7	1,1	1 ml	10 ml	34 kg	1360	6,8	3,4	2,3		10 ml
35 kg	700	3,5	1,8	1,2	1 ml	10 ml	35 kg	1400	7,0	3,5	2,3		10 ml
36 kg	720	3,6	1,8	1,2	1 ml	10 ml	36 kg	1440	7,2	3,6	2,4		10 ml
37 kg	740	3,7	1,9	1,2	1 ml	10 ml	37 kg	1480	7,4	3,7	2,5		10 ml
38 kg	760	3,8	1,9	1,3	1 ml	10 ml	38 kg	1520	7,6	3,8	2,5		10 ml
39 kg	780	3,9	2,0	1,3	1 ml	10 ml	39 kg	1560	7,8	3,9	2,6		10 ml
40 kg	800	4,0	2,0	1,3	1 ml	10 ml	40 kg	1600	8,0	4,0	2,7		10 ml
42 kg	840	4,2	2,1	1,4	1 ml	10 ml	42 kg	1680	8,4	4,2	2,8		10 ml
44 kg	880	4,4	2,2	1,5	1 ml	10 ml	44 kg	1760	8,8	4,4	2,9		10 ml
46 kg	920	4,6	2,3	1,5	1 ml	10 ml	46 kg	1840	9,2	4,6	3,1		10 ml
48 kg	960	4,8	2,4	1,6		10 ml	48 kg	1920	9,6	4,8	3,2		10 ml
50 kg	1000	5,0	2,5	1,7		10 ml	50 kg	2000	10,0	5,0	3,3		10 ml

1) Dosering enligt FASS text för Absenor® oral droppar 200 mg/ml

2) Tabellen är baserad på initial behandling och dosen kan ökas med 3 dagars intervall (75–150 mg/dygn) till anfallsfrihet.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Absenor®, Absenor® Depot (valproinsyra) antiepileptika [Rx] F

Indikation och subvention: Epilepsi. Generaliserade epilepsianfall såsom tonisk-kloniska anfall (grand mal), absenser (petit mal), myoklona anfall och atoniska anfall. Partiella (fokala) anfall. Behandling av maniska episoder vid bipolär sjukdom när litium är kontraindicerat eller inte tolereras. Fortsatt behandling efter den maniska episoden kan övervägas hos patienter som har svarat på natriumvalproat vid akut mani. **Försiktighet och varningar:** Valproat har en hög teratogen potential. Valproat är kontraindicerat under graviditet. Kvinnor i fertil ålder måste använda lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet.

Graviditetspreventionsprogram ska genomföras vid behandling av kvinnor i fertil ålder.

Kontraindikationer: Graviditet, leverinsufficiens, porfyri, mitokondriell sjukdom, rubbning i ureacykeln och överkänslighet mot valproinsyra eller ingående hjälpämne.

Absenor®: Enterotabletter 100 mg, 300 mg och 500 mg. Orala droppar, lösning 200 mg/ml. Oral lösning 60 mg/ml. **Absenor® Depot:** Depottabletter 300 mg och 500 mg.

Senaste översyn av produktresumé: 2023-12-18.

För priser och ytterligare information se www.fass.se