

Breyanzi®

(lisokabtagen-maraleucel)

PATIENTKORT

Ha alltid med dig detta kort. Visa det för alla läkare/vårdgivare som du träffar, även i nödsituationer.

- Tala om för alla vårdgivare du träffar att du behandlas med Breyanzi®.
- Du bör hålla dig i närheten av kliniken där du fick Breyanzi® i minst 4 veckor efter din behandling.

Jag har behandlats med Breyanzi®

Viktig kontaktinformation

Mitt namn: _____

Namn på läkare som ger Breyanzi®-behandlingen (TEXTA):

Telefonnummer till sjukhus (dagtid): _____

Telefonnummer till sjukhus (efter kontorstid): _____

Sjukhusets namn: _____

Datum för infusion med Breyanzi®: _____
(ÅÅÅÅ-MM-DD)

Tillverkningssatsnummer (TEXTA): _____

Information till vårdgivare

Denna patient har fått Breyanzi® chimär antigenreceptor (CAR)+ T-cells-behandling, en cellbaserad produkt av genetiskt modifierade autologa celler riktade mot CD19 (CD=differentieringkluster) och som består av renade CD8-positiva och CD4-positiva T-celler i en definierad sammansättning. T-cellerna är separat transducerade ex-vivo med en replikationsinkompetent lentiviralvirusvektor som uttrycker en chimär antigenreceptor riktad mot CD19.

Efter behandling med Breyanzi® kan cytokinfrisättningssyndrom (CRS) och/eller neurologiska toxiciteter (inklusive immuneffektorcell-associerat neurotoxicitetssyndrom (ICANS)) förekomma, vilka kan vara dödliga eller livshotande. Cytokinfrisättningssyndrom kan drabba alla organsystem.

Kontakta omedelbart läkaren som gav Breyanzi®-behandlingen för mer information.

Information till dig som patient

Breyanzi® kan orsaka biverkningar som kan vara allvarliga eller livshotande.

Kontakta läkaren som gav dig Breyanzi®-behandlingen eller uppsök akutmottagning omedelbart om du får något av följande symtom:

Neurologiska biverkningar

Följande kan vara symtom på ICANS:

- Förvirring
- Mindre alert (sänkt medvetandegrad)
- Talsvårigheter eller sluddrigt tal
- Skakningar (tremor)
- Ångest
- Yrsel
- Huvudvärk

Cytokinfrisättningssyndrom (CRS)

- Feber
- Frossa eller skakningar
- Trötthetskänsla
- Snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens
- Svimningskänsla och andnöd

För ytterligare information eller för att ladda ner en kopia av detta dokument, vänligen besök fass.se