

Patientdagbok

Du behandlas med Leuprorelin Sandoz® enligt läkarens ordination.
Tag med dig dagboken vid varje behandlingstillfälle.

Namn:

Personnummer:

Kontakt

Mottagning:

Sjuksköterska: Behandlande läkare:

Telefonnummer:

Behandlingstillfälle

Datum	Tid	Läkare/Sköterska

Mer information

För dig som söker mer information finns Prostatacancerförbundet, en riks-organisation med regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående.

www.prostatacancerforbundet.se

Förkortad bipacksedelinformation. OBS! Läs noggrant hela bipacksedeln som medföljer förpackning.

Leuprorelin Sandoz® 5 mg (Leuprorelin). **Beredningsform:** Implantat, vit eller gulaktig stav av cylinderform i förfylld spruta. **Indikation:** 1) Palliativ behandling av patienter med avancerad hormonberoende prostatacancer. 2) Behandling av lokalt avancerad, hormonberoende prostatacancer samtidigt med och efter strålbehandling. 3) Behandling av lokaliserad, hormonberoende prostatacancer hos patienter med måttlig och hög risk i kombination med strålbehandling. **Dosering:** Leuprorelin Sandoz ska administreras av hälso- och sjukvårdspersonal. Implantatet (innehållande 5 mg leuprorelin) injiceras subkutant i främre bukväggen var tredje månad. **Varningar och försiktighet:** Om du får svår eller återkommande huvudvärk, problem med synen och ringningar eller susningar i öronen, ska du omedelbart kontakta läkare. Det finns en ökad risk för depression. Kontakta din läkare eller sjuksköterska om symtom på depression uppkommer. Om du har hypertoni eller diabetes kan din läkare vilja övervaka behandlingen ytterligare. Behandlingsresultatet av Leuprorelin Sandoz ska kontrolleras regelbundet enligt det intervall din läkare anger. Fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du har frågor om ditt läkemedel. **Datum för senaste översyn av produktresumén:** 2022-08-18. **Innehavare av marknadsföringstillstånd:** Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn, Danmark, www.sandoz.com. NR2302109047 Feb 2023.




Information till dig som
står på behandling med
Leuprorelin Sandoz®

NR2302203607_02/2023



Denna guide är till för dig som blivit ordinerad behandling med Leuprorelin Sandoz® av din läkare. Guiden innehåller information om behandling och svar på de viktigaste frågorna om Leuprorelin Sandoz®. Denna guide ersätter inte läkarens anvisningar.

Kontakta alltid din läkare eller sjuksköterska om du har frågor om behandlingen. Ytterligare information finns i bipacksedeln som följer med Leuprorelin Sandoz®.



Prostata och prostatacancer

Prostatan, eller blåshalskörteln som den också kallas, är belägen vid urinrörets översta del under urinblåsan och består av många små körtlar som är placerade runt urinröret. Prostatan både lagrar och producerar en del av det sekret som ingår i sädesvätskan. Prostatan är stor som en valnöt och väger ungefär 20 gram i naturligt tillstånd.

Prostatacancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos män i Sverige, ungefär en av 10 män drabbas. Orsaken till sjukdomen är inte känd, den är vanligare hos äldre män men även ärftlighet anses öka risken för tumörutveckling. Prostatan tillväxer genom närvaro av det manliga könshormonet testosteron och därför kallar man detta för en hormonberoende cancersjukdom.

Tumörtillväxten är oftast långsam och utan symptom vilket gör att det kan dröja länge innan tumören sprider sig och blir livshotande. Vid behandling av prostatacancer är kirurgi, strålterapi eller hormonbehandling de vanligaste behandlingsalternativen. I vissa fall behövs ingen behandling alls och i andra fall kan man behöva lägga till cellgiftsbehandling.

Hormonbehandling med Leuprorelin Sandoz® – en GnRH-analog

Den här broschyren vänder sig till dig som fått preparatet Leuprorelin Sandoz® utskrivet av din doktor för hormonbehandling av din prostatacancer. Leuprorelin Sandoz® är en GnRH-analog. GnRH betyder gonadotropinfrisättande hormon och genom att tillföra en GnRH-analog (som liknar GnRH) kan man hämma frisättningen av gonadotropiner i kroppen. Gonadotropinerna styr i sin tur produktionen av testosteron och genom denna blockering av gonadotropinerna så kan man således sänka testosteronnivån i kroppen. Eftersom prostatatumören behöver testosteron för tillväxt och spridning så kan man på detta sätt strypa tillgången av testosteron vilket gör att tumörens aktivitet avstannar.

Biverkningar i samband med GnRH-behandling

Testosteron har betydelse för hälsa och välbefinnande genom sin inverkan på könsdrift, immunförsvar, skelett och muskulatur. Vid behandling med en GnRH-analog, där testosteronnivån sjunker, kan olika typer av biverkningar uppstå som är kopplade till testosteronets effekt, både fysiska och mentala.

En del patienter upplever inga biverkningar alls medan andra känner sig mer trötta, nedstämda och muskelsvaga än tidigare. Den sänkta testosteronnivån gör att den sexuella lusten sjunker och många män får problem med erektionen.

Värmevallningar och svettningar är ett vanligt problem, vissa patienter upplever minskad aptit medan andra upplever en viktökning. Bensmärta, minskad testikelstorlek och ömhet i bröstet är andra bekymmer som kan uppstå i samband med hormonbehandling.

Många biverkningar kan man helt eller delvis bli av med, det finns både läkemedel och annan hjälp att tillgå, så tala alltid med din läkare eller sköterska om dessa besvär.

Hur går det till praktiskt att få Leuprorelin Sandoz®?

Leuprorelin Sandoz® är ett biologiskt nedbrytbart implantat och behandlingen går till så att du får en centimeterstor ljusgul stav placerad i underhuds fettet på buken med hjälp av en spruta. Från staven frisätts successivt den verksamma substansen Leuprorelin, som alltså är en variant av kroppens eget GnRH.

Vid behandling med Leuprorelin Sandoz® är behandlingsintervallet tre månader. Det betyder att du ska ha en ny spruta var tredje månad. En sådan här läkemedelsbehandling är lika effektiv som om man skulle ta bort testiklarna, därför kallar man detta för en kemisk kastration. Så fort behandlingen avslutas så kan testosteronet återgå till en normal nivå igen.

Behandlingstiden med Leuprorelin Sandoz® är individuell och hur länge just du ska behandlas är något som din läkare ger besked om. Om dess effekt är bra och du tolererar behandlingen väl, kan behandlingen fortsätta utan avbrott i flera år. Din läkare och sköterska kommer att kontrollera ditt PSA med regelbundna intervall för att utreda behandlingens effekt.

VIKTIGT:

Om du upplever förnyade symtom, såsom smärta eller urinerings-svårigheter, är det viktigt att du hör av dig till behandlande läkare och sköterska. Om behandlingen skulle avbrytas utan din läkares tillstånd, kan dina sjukdomsrelaterade symtom förvärras.