

Biverkningar

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Adport försämrar din kropps immunförsvar vilket innebär att din kropp inte kommer att vara lika bra på att stå emot infektioner som vanligt.

Kontakta läkaren eller sjukhuset om du får biverkningar.

Kontakta omedelbart läkare om du får problem med din syn: dimsyn, förändringar i färgseende, svårighet att se detaljer eller om ditt synfält begränsas.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): högt blodsocker, diabetes, ökad kaliumhalt i blodet, sömnsvårigheter, skakningar, huvudvärk, högt blodtryck, diarré, illamående, njurproblem.

Se övriga biverkningar i bipacksedeln.

Graviditet och amning

Takrolimus utsöndras i bröstmjölken, och därför ska du inte amma under tiden du tar Adport. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, ska du rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil eller använd några maskiner eller arbetsredskap om du känner dig yr eller sömnig eller om du har problem att se klart efter att du tagit läkemedlet. Läkemedlet kan försämra förmågan att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att utföra dessa uppgifter.

Överblivet läkemedel


Överblivet läkemedel ska inte kastas i avloppet eller i hushållsavfall, utan ska lämnas till apotekets insamling av gamla och överblivna läkemedel. På så sätt skyddar vi miljön.

SANDOZ

Sandoz A/S, www.sandoz.se,
info.sverige@sandoz.com

Källa: Adport bipacksedel 7/2022
NR2403218403, 03/2024

PATIENTGUIDE
Adport® (takrolimus)



SANDOZ

adport[®]
TAKROLIMUS


Du har fått läkemedlet Adport® med det verksamma ämnet takrolimus förskrivet av din läkare. I den här informationsbroschyren får du anvisningar för hur du på ett korrekt och säkert sätt använder läkemedlet. Läs även noggrant igenom bipacksedeln innan du börjar använda läkemedlet.

Efter en organtransplantation (av t.ex. lever, njure eller hjärta) försöker kroppens immunsystem att stöta bort det nya organet. Adport påverkar kroppens immunförsvar och förhindrar kroppen från att stöta bort det nya organet. Adport används ofta i kombination med andra läkemedel som också nedsätter immunförsvaret.

Adport används antingen

- för att förhindra avstötning av organet eller
- för att behandla pågående avstötning om en tidigare behandling som du genomfört inte har kunnat påverka immunförsvaret i tillräcklig grad efter din transplantation.

Läkemedlet Adport får inte bytas ut mot ett annat läkemedel med takrolimus på apoteket. Kontrollera att det står samma produktnamn på läkemedelsordinationen och förpackningen och att kapseln ser ut som på bilden nedan:



Användning av Adport

Ta inte Adport om du är allergisk mot takrolimus eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se bipacksedeln) eller mot något antibiotikum som tillhör gruppen makrolida antibiotika (t.ex. erytromycin, klaritromycin, josamycin).

Förvaring

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i originalförpackningen vid högst 30 °C. Fuktkänsligt. Får ej användas efter utgångsdatumet (sista dagen i angiven månad) som anges på förpackningen.

Använd alla kapslar inom 12 månader efter att aluminiumpåsen som omger tryckförpackningen har öppnats. Den ska förvaras vid högst 25 °C efter att aluminiumpåsen har öppnats. Aluminiumpåsen innehåller torkmedel som skyddar mot fukt. Torkmedlet ska ej sväljas!

Ta kapseln ur tryckförpackningen precis innan du ska ta den.

Hur du tar läkemedlet

- Ta alltid läkemedlet enligt läkarens anvisningar: två gånger dagligen, oftast morgon och kväll.
- Ta kapseln ur tryckförpackningen precis innan du ska ta den.
- Svälj kapslarna hela med ett glas vatten. Adport tas i allmänhet på fastande mage: minst 1 timme före eller 2–3 timmar efter en måltid.
- Obs! Undvik grapefrukt och grapefruktjuice när du tar Adport.

Varningar och försiktighet

- Du bör begränsa din exponering för solljus och UV-strålning eftersom det finns en möjlig risk för elakartade hudförändringar vid läkemedelsbehandlingen. Använd solkräm med hög solskyddsfaktor och lämpliga skyddande kläder om du vistas i solen.
- Om du behöver vaccineras, ska du tala om det för din läkare i förväg.
- Undvik grapefrukt och grapefruktjuice.



Om du har glömt att ta läkemedlet

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Vänta tills det är dags för nästa dos och fortsätt sedan att ta läkemedlet som tidigare.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel, ska du alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 010-456 6700) för en bedömning av risken och rådgivning.

Uppföljning av läkemedelsbehandling

Läkaren ordinerar regelbundna blodprover för att följa ditt allmäntillstånd och fastställa en korrekt läkemedelsdos. Följ alltid läkarens anvisningar. Avbryt inte behandlingen om inte din läkare har sagt att du ska göra det.

Adport och andra läkemedel

Tala alltid om för din läkare om du tar andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel.

Adport får inte tas tillsammans med ciklosporin. Undvik Johannesört och andra naturläkemedel eftersom dessa kan påverka läkemedlets effekt och dosering.

Tala om för din läkare om du under Adportbehandlingen tar till exempel ibuprofen, amfotericin B eller läkemedel mot virusinfektioner (t.ex. aciklovir), kaliumtillskott eller kaliumsparande urindrivande medel, blodförtunnande eller läkemedel mot diabetes som tas via munnen.

Läs mer i bipacksedeln.

