

Biverkningar

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Dailiport försämrar din kropps immunförsvar vilket innebär att din kropp inte kommer att vara lika bra på att stå emot infektioner som vanligt.

Kontakta läkaren eller sjukhuset om du får biverkningar.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

högt blodsocker, diabetes, ökad kaliumhalt i blodet, sömnsvårigheter, skakningar, huvudvärk, högt blodtryck, onormala leverfunktionsvärden, diarré, illamående, njurproblem.

Kontakta omedelbart läkare om du får problem med din syn, såsom dimsyn, förändringar i färgseende, svårighet att se detaljer eller om ditt synfält begränsas.

Graviditet och amning

Takrolimus utsöndras i bröstmjölken, och därför ska du inte amma under tiden du tar läkemedlet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, ska du rådfråga läkare innan du använder Dailiport.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil eller använd några maskiner eller arbetsredskap om du känner dig yr eller sömnig eller om du har problem att se klart efter att du tagit läkemedlet. Läkemedlet kan försämma förmågan att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att utföra dessa uppgifter.

Överblivna läkemedel


Överblivet läkemedel ska inte kastas i avloppet eller i hushållsavfall, utan ska lämnas till apotekets insamling av gamla och överblivna läkemedel. På så sätt skyddar vi miljön.

SANDOZ

Sandoz A/S, www.sandoz.se,
info.sverige@sandoz.com

Källa: Dailiport bipacksedel 7/2022
NR2403218406, 03/2024

PATIENTGUIDE Dailiport® (takrolimus)



SANDOZ

dailiport®
TAKROLIMUS
depotkapsel


Du har fått läkemedlet Dailiport® med det verksamma ämnet takrolimus förskrivet av din läkare. I den här informationsbroschyren får du anvisningar för hur du på ett korrekt och säkert sätt använder läkemedlet. Läs även noggrant igenom bipacksedeln innan du börjar använda läkemedlet.

Efter en organtransplantation (av t.ex. lever eller njure) försöker kroppens immunsystem att stöta bort det nya organet. Dailiport påverkar kroppens immunförsvar och förhindrar kroppen från att stöta bort det nya organet.

Dailiport används hos vuxna patienter

- för att förhindra avstötning av organet eller
- för att behandla pågående avstötning om en tidigare behandling som du genomfört inte har kunnat kontrollera immunförsvaret efter din transplantation.

Läkemedlet Dailiport får inte bytas ut mot ett annat läkemedel med takrolimus på apoteket. Kontrollera att det står samma produktnamn på läkemedelsordinationen och förpackningen och att kapseln ser ut som på bilden nedan.



Användning av Dailiport

Ta inte Dailiport om du är allergisk mot takrolimus eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se bipacksedeln), sirolimus, något antibiotikum som tillhör gruppen makrolida antibiotika (t.ex. erytromycin, klaritromycin, josamycin), jordnötter eller soja.

Förvaring

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i originalförpackningen. Läkemedlet är fukt- och ljuskänsligt och får ej användas efter utgångsdatumet (sista dagen i angiven månad) som anges på förpackningen.

Använd alla kapslar inom 12 månader efter att aluminiumpåsen som omger tryckförpackningen har öppnats. Aluminiumpåsen innehåller torkmedel som skyddar mot fukt. Torkmedlet ska ej sväljas.

Ta kapseln ur tryckförpackningen precis innan du ska ta den.

Hur du tar läkemedlet

- Ta alltid läkemedlet enligt läkarens anvisningar: **en gång dagligen, på morgonen.**
- Ta kapseln ur tryckförpackningen precis innan du ska ta den.
- Svälj kapslarna hela med ett glas vatten.** Dailiport tas på fastande mage: 2–3 timmar efter måltid. Vänta minst en timme innan nästa måltid.
- Obs! Undvik grapefrukt och grapefruktjuice när du tar Dailiport.

Varningar och försiktighet

- Du bör begränsa din exponering för solljus och UV-strålning** eftersom det finns en möjlig risk för elakartade hudförändringar vid läkemedelsbehandlingen. Använd solkräm med hög solskyddsfaktor och lämpliga skyddande kläder om du vistas i solen.

- Om du behöver vaccineras**, ska du tala om det för din läkare i förväg.



Om du har glömt att ta läkemedlet

Om du har glömt att ta Dailiportkapslarna på morgonen, ska du ta dem så snart som möjligt samma dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel, ska du alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 010-456 6700) för en bedömning av risken och rådgivning.

Uppföljning av läkemedelsbehandling

Håll regelbunden kontakt med din läkare. Läkaren kan emellanåt ordinera blod- och urinprover samt hjärt- och synundersökningar för att fastställa korrekt dos av Dailiport. **Följ alltid läkarens anvisningar.** Avsluta endast behandling när läkaren har ordinerat det.

Dailiport och andra läkemedel

Tala alltid om för din läkare om du tar eller ska börja ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och växtbaserade läkemedel som Johannesört.

Dailiport bör inte användas tillsammans med t.ex. ciklosporin. **Läs mer i bipacksedeln, punkt 2.**

Tala om för din läkare om du under Dailiport-behandlingen tar till exempel ibuprofen, amfotericin B eller läkemedel mot virusinfektioner (t.ex. aciklovir), kaliumtillskott eller kaliumsparande urindrivande medel, blodförtunnande eller läkemedel mot diabetes som tas via munnen.

