

Schema för leverfunktionstester med Agomelatin

☐ Agomelatin 25mg

- ☐ Före start av 25mg ALAT.....µkat/l
ASAT.....µkat/l
- ☐ Vecka 3 ALAT..... µkat/l
ASAT.....µkat/l
- ☐ Vecka 6 ALAT..... µkat/l
ASAT.....µkat/l
- ☐ Vecka 12 ALAT.....µkat/l
ASAT.....µkat/l
- ☐ Vecka 24 ALAT.....µkat/l
ASAT..... µkat/l

Utför ett test närhelst kliniskt indicerat.

☐ I händelse av dosökning **till 50mg**, återupprepa testschemat.

- ☐ insättande av 50mg ALAT..... µkat/l
ASAT.....µkat/l
- ☐ Vecka 3 ALAT..... µkat/l
ASAT.....µkat/l
- ☐ Vecka 6 ALAT..... µkat/l
ASAT..... µkat/l
- ☐ Vecka 12 ALAT..... µkat/l
ASAT.....µkat/l
- ☐ Vecka 24 ALAT..... µkat/l
ASAT.....µkat/l

Utför ett test närhelst kliniskt indicerat.

Patientens namn: _____

Datum för behandlingsstart: _____

Symtom eller tecken på potentiell leverskada*

Serumtransaminaser (ALAT, ASAT)

ALAT och/eller ASAT
**> 3 ggr den övre gränsen
for normalvärdet**

Förhöjt ALAT och/eller ASAT
**≤ 3 ggr den övre gränsen
for normalvärdet**

Normalvärde

Symtom eller tecken på potentiell leverskada*

Inga symtom eller tecken på potentiell leverskada
Upprepa leverfunktionstester inom 48 timmar

ALAT och/eller ASAT
> 3 ggr den övre gränsen for normalvärdet

ALAT och/eller ASAT
≤ 3 ggr den övre gränsen for normalvärdet

✗ Avbryt

Leverfunktionstester
(inklusive transaminaser) ska
utföras

✗ Avbryt behandlingen

Utför regelbundet leverfunktionstester
tills serumtransaminaserna återgår till
det normala

✓ Fortsätt behandlingen

Följ tidschemat for leverfunktionstester

* Tecken som mörk urin, ljus avföring, gul hud/gula ögon, smärta i den övre, högra delen av buken, kvarstående ny och oförklarlig trötthet