


Guide för föräldrar och vårdnadshavare: Viktiga saker att komma ihåg om behandling med Fingolimod Teva (fingolimod)


Vad är multipel skleros?

Multipel skleros (MS) anses vara en immunmedierad sjukdom – kanske autoimmun. Immunsystemet angriper den skyddande myelinskida som omger nervcellerna i centrala nervsystemet (CNS), som består av hjärnan och ryggmärgen. Namnet kommer från den ärrbildning (skleros) som inflammatoriska angrepp orsakar på flera (multipla) ställen i CNS.



Hur fungerar Fingolimod Teva?

Det är inte helt klarlagt hur behandling med Fingolimod Teva fungerar vid MS. Fingolimod Teva binder till vita blodkroppar (lymfocyter) i blodet genom att interagera med proteiner på cellytan som kallas sfingosin 1-fosfat-(S1P)-receptorer. Vita blodkroppar som interagerar med Fingolimod Teva fastnar i lymfkörtlarna och hindras därigenom från att ta sig vidare in i CNS, där de skulle orsaka inflammation och skada.



Kontraindikationer och varningar

	Fingolimod Teva (fingolimod) ska inte användas av patienter med vissa hjärtsjukdomar och rekommenderas inte till patienter som även tar läkemedel som gör att hjärtat slår långsammare. Fingolimod Teva får inte användas av kvinnor som är gravida eller av fertila kvinnor (inklusive tonårsflickor) som inte använder en effektiv preventivmetod.
	Läkaren kommer att be ditt barn att stanna kvar på mottagningen eller kliniken i minst sex timmar efter att ha tagit den första dosen så att lämpliga åtgärder kan vidtas om några biverkningar skulle uppstå. I vissa fall kan barnet även behöva stanna över natten. Samma försiktighetsåtgärder kommer att vidtas om den dagliga dosen ökas från 0,25 mg till 0,5 mg.
	Om du är förälder/vårdnadshavare till en fertil tonårsflicka kommer du att få ett patientkort med graviditetsinformation. Läs bipacksedeln noga innan ditt barn påbörjar behandlingen med Fingolimod Teva. Informera läkaren om ditt barn eller en släkting till barnet har eller har haft epilepsi. Kontakta omedelbart läkaren om ditt barn får någon biverkning under behandlingen med Fingolimod Teva.

	Alla läkare som träffar ditt barn måste få veta att barnet tar Fingolimod Teva
--	--

Innan ditt barn börjar med Fingolimod Teva

	Graviditet – Fingolimod Teva är fosterskadande. Flickor i fertil ålder ska informeras av läkaren om de allvarliga riskerna för fostret vid behandling med Fingolimod Teva, och de måste ha ett negativt graviditetstest (bekräftat av vårdpersonal) innan de påbörjar behandlingen med Fingolimod Teva.
	Cancer kopplad till humant papillomvirus (HPV) – Läkaren kommer att göra en bedömning av om ditt barn behöver genomgå en cancerscreening (inklusive cellprov) och om det ska få HPV-vaccin
	Leverfunktion – Fingolimod Teva kan ge avvikande leverfunktionsvärden. Barnet kommer att få lämna blodprov innan behandlingen med Fingolimod Teva påbörjas.
	Krampanfall – Krampanfall kan förekomma under behandlingen. Informera läkaren om barnet eller någon släkting till barnet har eller har haft epilepsi.

Första gången ditt barn tar Fingolimod Teva

	Långsam hjärtfrekvens (bradykardi) och oregelbunden hjärtrytm I början av behandlingen får Fingolimod Teva hjärtat att slå långsammare. Detta kan orsaka yrsel eller att blodtrycket sjunker. Om ditt barn får symptom som yrsel, svindel, illamående eller hjärklappning eller känner obehag efter att ha tagit den första dosen av Fingolimod Teva, ska du genast informera barnets läkare. Innan ditt barn får den första dosen av Fingolimod Teva görs följande undersökningar: ➤ Elektrokardiogram (EKG) för att kontrollera hjärtfunktionen ➤ Blodtrycksmätning ➤ Bedömning av fysisk utveckling ➤ Mätning av längd och vikt Under de 6 timmarnas övervakning görs följande kontroller: ➤ Puls och blodtryck mäts varje timme Barnet övervakas eventuellt med kontinuerligt EKG under denna tid
---	--

	➤ EKG i slutet av 6-timmarsperioden
	Kontakta barnets läkare vid behandlingsuppehåll. Den initiala effekten på hjärtfrekvensen kan återkomma om medicinerings återupptas efter ett uppehåll i behandlingen med Fingolimod Teva i minst 1 dag under de två första behandlingsveckorna, eller i mer än 7 dagar under behandlingsvecka 3 och 4 eller om Fingolimod Teva-behandlingen har avbrutits i mer än 2 veckor efter att behandlingen har pågått i minst en månad. När behandlingen med Fingolimod Teva återupptas kan läkaren besluta att hjärtfrekvensen och blodtrycket ska mätas varje timme, att EKG-undersökningar ska göras och, vid behov, att barnet ska stanna kvar över natten för övervakning.

Medan ditt barn tar Fingolimod Teva

	Infektioner – Eftersom Fingolimod Teva påverkar immunsystemet ökar risken för infektioner. Om du tror att ditt barn har något av följande under och upp till 2 månader efter avslutad behandling ska du genast kontakta barnets läkare: huvudvärk åtföljd av stel nacke, ljuskänslighet, feber, influensaliknande symtom, illamående, utslag, bältros och/eller förvirring eller krampanfall (kan vara symtom på hjärnhinneinflammation och/eller encefalit, antingen orsakad av svamp- eller virusinfektion). Om du tycker att barnets MS försämras (t.ex. svaghet eller synförändringar), eller om du märker några nya symtom, ska du snarast möjligt tala med barnets läkare eftersom detta kan vara symtom på en sällsynt infektion i hjärnan, som kallas progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).
	Hudcancer – Hudcancer har rapporterats hos MS-patienter som behandlas med Fingolimod Teva. Informera genast barnets läkare om du upptäcker att det har några hudknutor (t.ex. blanka, pärlmorskimrande knutor), fläckar eller öppna sår som inte läker inom några veckor. Symtom på hudcancer kan inkludera onormal tillväxt av hudvävnad eller hudförändringar (t.ex. onormala leverfläckar) som över tid ändrar färg, form och storlek.
	Leverfunktion – Några fall av akut leversvikt som kräver levertransplantation och kliniskt signifikant leverskada har rapporterats. Barnet kommer att få lämna blodprov månad 1, 3, 6, 9 och 12 under behandlingen med Fingolimod Teva och regelbundet därefter. Informera barnets läkare om du märker att barnet har en gulfärgning av huden eller ögonvitor, onormalt mörk urin, smärta på höger sida av magen, trötthet, känner sig mindre hungrig än vanligt eller oförklarligt illamående och kräkningar, eftersom det kan vara tecken på leverskada.
	Graviditet – Fertila flickor måste göra graviditetstester med

	lämpliga mellanrum under behandling med Fingolimod Teva. Tonårsflickor <u>måste</u> få regelbunden information om de allvarliga riskerna för fostret vid behandling med Fingolimod Teva. Informationen ska lämnas av vårdpersonal med stöd av patientkortet med graviditetsinformation. På grund av de allvarliga riskerna för fostret <u>måste</u> tonårsflickor använda en effektiv preventivmetod under behandling med Fingolimod Teva och i 2 månader efter avslutad behandling. Rapportera genast till flickans läkare om hon (avsiktligt eller oavsiktligt) blir gravid medan hon tar Fingolimod Teva och upp till 2 månader efter avslutad behandling.
	Synsymtom – Fingolimod Teva kan orsaka svullnad i gula fläcken, ett tillstånd som kallas makulaödem. Informera läkaren om ditt barn upplever synförändringar under behandlingen eller upp till 2 månader efter avslutad behandling.
	Depression och ångest – Båda tillstånden har rapporterats hos barn/ungdomar som behandlats med fingolimod. Informera läkaren om ditt barn får sådana symtom.
	Om behandlingen med Fingolimod Teva avslutas kan sjukdomen åter bli aktiv. Läkaren kommer att avgöra om och i så fall hur barnet behöver övervakas efter att behandlingen med Fingolimod Teva har avslutats.

För att bestämma effekterna av exponering av Fingolimod Teva hos gravida kvinnor med MS, uppmanas läkare att rapportera gravida patienter som kan ha behandlats med Fingolimod Teva, när som helst under graviditeten (från 8 veckor före sista menstruation och framåt) till Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se).