

Fingolimod Teva (fingolimod): Patientkort med graviditetsinformation

Innan behandling med Fingolimod Teva påbörjas

	Fingolimod Teva (fingolimod) är kontraindicerat för gravida kvinnor och fertila kvinnor (inklusive tonårsflickor) som inte använder en effektiv preventivmetod. När du börjar med behandlingen kommer läkaren att informera dig om risken för fosterskada och de åtgärder du måste vidta för att minimera denna risk. Informationen kommer att upprepas regelbundet. Innan behandlingen påbörjas måste du lämna ett graviditetstest som bekräftas vara negativt av en läkare. Läkaren kommer att informera dig om att du måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i 2 månader efter avslutad behandling. Tala med din läkare om vilka effektiva preventivmetoder du kan använda. Läs patientguiden om Fingolimod Teva som du får av din läkare.
---	---

Medan du tar Fingolimod Teva

	Kvinnor får inte bli gravida under behandling. Kvinnor i fertil ålder måste använda en effektiv preventivmetod medan de tar Fingolimod Teva. Kvinnor får inte bli gravida under behandlingen eller inom 2 månader efter avslutad behandling. Graviditetstester måste göras regelbundet.
	Läkaren kommer att regelbundet ge dig information om de allvarliga riskerna för fostret vid behandling med Fingolimod Teva. Om du blir eller vill bli gravid, diskutera detta med din läkare eftersom du måste avsluta behandlingen med Fingolimod Teva. Om du blir gravid kommer din läkare att ge dig råd. Läkaren kommer att informera dig om de fosterskadande effekter som Fingolimod Teva kan ha och göra en bedömning av det möjliga utfallet av graviditeten. En ultraljudsundersökning ska göras och behandlingen med Fingolimod Teva kommer att avslutas.

Efter avslutad behandling med Fingolimod Teva

Informera din läkare omedelbart om du tycker att din MS försämras (t.ex. svaghet eller synförändringar) eller om du märker några nya symtom efter att du har avslutat behandlingen med Fingolimod Teva på grund av en graviditet.

Du måste använda en effektiv preventivmetod i 2 månader efter avslutad behandling med Fingolimod Teva eftersom det tar så lång tid för Fingolimod Teva att lämna kroppen.

För att bestämma effekterna av exponering av Fingolimod Teva hos gravida kvinnor med MS, uppmanas läkare att rapportera gravida patienter som kan ha behandlats med Fingolimod Teva, när som helst under graviditeten (från 8 veckor före sista menstruation och framåt) till Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se).