

ÖVERLÄMNING

Patientkort

- Fyll i kontaktuppgifter i patientkortet och byt ut det vid behov.
- Ge patienten/ombudet patientkortet och diskutera dess innehåll regelbundet vid varje besök och minst en gång per år under behandlingen.
- Utbilda patienten/ombudet att visa patientkortet till andra läkare/vårdpersonal som involveras i vård av patienten (till exempel vid olycksfall).
- Påminn patienten om att kontakta läkare om symtom på leversjukdom och infektion uppkommer som anges på patientkortet.
- Ge råd och informera kvinnor i fertil ålder, inklusive ungdomar/deras föräldrar/vårdnadshavare, innan behandling och regelbundet därefter, om potentiella risker för fostret.
- Att rapportera misstänkta biverkningar efter godkännande av teriflunomid är viktigt; det möjliggör kontinuerlig övervakning av nytta/riskförhållandet för produkten.
- Hälso- och sjukvårdspersonal ska i enlighet med gällande nationella föreskrifter rapportera graviditeter och misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket (Box 26, 751 03, Uppsala; www.lakemedelsverket.se). Sanofi kan kontaktas via telefon (08-634 5000) eller via e-post (infoavd@sanofi.com).

Patienten har informerats om och förstår den nytta och de risker som är förenade med denna behandling.

Förskrivarens namn: _____

Förskrivarens signatur: _____

Utbildningsmaterial, version 5, december 2024



GUIDE FÖR VÅRDPERSONAL



- Diskutera nedanstående information med patienten gällande risker vid behandling
- Läs produktresumén för fullständig information vid förskrivning

Patientens namn:		Patientens ålder:	
Första besöksdatum:	Kön: ☐ Man ☐ Kvinna		
Första förskrivningsdatum:	Dagens datum:		

Utbildningsmaterial, version 5, december 2024



Hematologiska effekter

- Risk för minskat antal blodkroppar (påverkar främst vita blodkroppar)
- En fullständig blodstatus innan behandlingen påbörjas och därefter vid behov under behandlingen, baserat på kliniska tecken och symtom



Infektioner/allvarliga infektioner

- Risk för (allvarliga opportunistiska) infektioner
- Behov av att omedelbart kontakta behandlande läkare vid tecken eller symtom på infektion eller om patienten använder andra läkemedel som påverkar immunförsvaret
- Överväg accelererad elimineringsprocedur om allvarliga infektioner uppkommer



Blodtryck

- Risk för hypertoni
- Kontrollera blodtrycket före samt regelbundet under behandlingen
- Behov av att kontakta behandlande läkare om hypertoni uppkommer



Leverpåverkan

- Risk för effekter på levern
- Kontrollera leverfunktionsprover innan behandlingen påbörjas samt regelbundet under behandlingen
- Tecken och symtom på leversjukdom
- Behov av att omedelbart kontakta behandlande läkare om sådana symtom uppkommer



För kvinnor i fertil ålder, inklusive ungdomar

- Potentiell risk för teratogenicitet
- Testa för eventuell graviditet innan behandlingen påbörjas
- Testa för möjlighet för graviditet hos alla fertila kvinnor inklusive patienter under 18 år
- Graviditet ska uteslutas
- Behov av ett effektivt preventivmedel innan, under och efter behandlingen
- Behov av att omedelbart informera läkaren om de slutar använda preventivmedel eller före byte av en preventivmetod
- Behov av att avbryta behandlingen med Aubagio och omedelbart kontakta läkare vid graviditet
 - Överväg accelererad elimineringsprocedur
 - Rapportera i enlighet med gällande nationella föreskrifter graviditeter och misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket
 - Kontakta Sanofi AB via telefon (08-634 5000) eller via e-post (info@sanofi.com) för information om mätning av plasmakoncentrationen av teriflunomid

Föräldrar/vårdnadshavare till flickor

- Behov av att föräldrar/vårdnadshavare kontaktar läkare när flickan får sin första menstruation