

Diagram för den fortlöpande uppföljningen av behandling med Elvanse® (lisdexamfetamindimesylat)

Det här diagrammet är avsett att stödja dig i fortlöpande uppföljning av behandling med Elvanse® för vuxna patienter med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dvs. uppmärksamhetsstörning med överaktivitet).

Såsom anges i produktresumén (SmPC) och i produktförskrivningsinformationen, bör psykiskt och kardiovaskulärt status kontrolleras regelbundet hos patienter som får Elvanse®. Det rekommenderas att det här diagrammet används tillsammans med produktresumén för Elvanse® (klicka här för att visa). Viktigt:

- Blodtryck (med användning av kategorier som definierats av American Heart Association, som anges i Tabell 1 nedan) och hjärtfrekvens (puls) ska registreras i ett percentildiagram vid varje dosjustering och sedan minst var sjätte månad.
- **Tabell 1. Blodtryckskategorier som definierats av American Heart Association.**

Blodtryckskategori	Systoliskt mm Hg (övre värde)		Diastoliskt mm Hg (nedre värde)
Normalt	mindre än 120	och	mindre än 80
Prehypertoni	120–139	eller	80 – 89
Högt blodtryck (Hypertension) Stadium 1	140–159	eller	90 – 99
Högt blodtryck (Hypertension) Stadium 2	160 eller högre	eller	100 eller högre
Hypertensiv kris (Akutvård krävs)	Högre än 180	eller	Högre än 110

- Vikt ska journalföras och övervakas regelbundet under behandling
 - Utveckling av *nyttillkommen* eller försämring av befintliga psykiska sjukdomar ska övervakas vid varje dosjustering och sedan minst var sjätte månad och vid varje besök
 - Patienterna ska också övervakas för risken för avvikande användning, felaktig användning och missbruk av Elvanse®
- Ladda ner och skriv ut det här diagrammet före din konsultation. Du kan inte lagra någon patientspecifik information på webbplatsen. Det ifyllda diagrammet kan dokumenteras i patientens journal.

Datum för första bedömning:	
Patientens namn:	
Födelsedatum:	
Ålder:	Kön:

	Utgångsnivån, före initiering av behandling med Elvanse®	Efterföljande besök							
Datum för bedömning									
Blodtryck*									
Hjärtfrekvens (puls) (bpm)*									
Kroppsvikt (kg)**									

*Blodtryck (med användning av kategorier som definierats av American Heart Association, som anges i Tabell 1, såsom ovan) och puls ska journalföras i ett percentildiagram vid varje dosjustering och sedan minst var sjätte månad 6.

**Viktförändringar ska registreras