

Checklista 1 för vuxna: Checklista för Elvanse® (lisdexamfetamindimesylat) inför förskrivning

Den här checklistan är avsedd att stödja dig i lämplig insättning av Elvanse® för en vuxen patient med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dvs. uppmärksamhetsstörning med överaktivitet).

Såsom anges i produktresumén och produktförskrivningsinformationen, kan specifika samtidiga sjukdomar exkludera användningen av Elvanse® eller motivera särskild uppmärksamhet, inklusive hjärt- och neuropsykiatriska sjukdomar eller symtom. Det rekommenderas att denna checklista används tillsammans med produktresumén för Elvanse® ([klicka här för att visa](#)). Viktigt:

- Blodtryck (med användning av kategorier som definierats av American Heart Association, som anges i Tabell 1 nedan) och hjärtfrekvens (puls) ska journalföras i ett percentildiagram innan behandlingen sätts in, vid varje dosjustering och sedan minst var sjätte månad.
- Tabell 1. **Blodtryckskategorier som definieras av American Heart Association.**

Blodtryckskategori	Systoliskt mm Hg (övre värde)		Diastoliskt mm Hg (nedre värde)
Normalt	mindre än 120	och	mindre än 80
Prehypertoni	120–139	eller	80 – 89
Högt blodtryck (Hypertension) Stadium 1	140–159	eller	90 – 99
Högt blodtryck (Hypertension) Stadium 2	160 eller högre	eller	100 eller högre
Hypertensiv kris (Akutvård krävs)	Högre än 180	eller	Högre än 110

- Vikt ska journalföras innan behandlingen sätts in, och övervakas regelbundet under behandling
- Utvecklingen av *tillkommen* nytillkommen eller försämring av befintliga psykiska sjukdomar ska övervakas innan behandlingen sätts in, vid varje dosjustering och sedan minst var sjätte månad och vid varje besök

Ladda ner och skriv ut denna checklista före din konsultation. Du kan inte lagra någon patientspecifik information på webbplatsen. Den ifyllda checklistan kan dokumenteras i patientens journal.

När du går igenom checklistan kan det också vara fördelaktigt att diskutera bipacksedeln för Elvanse® ([klicka här för att visa](#)) med din patient.

Innan behandling med Elvanse® sätts in

Datum för bedömning:	
Patientens namn:	
Födelsedatum:	
Ålder:	Kön:

Patienter med något av följande tillstånd, komorbiditeter och/eller samtidig läkemedelsbehandling bör inte få Elvanse®:

Kontraindikationer	
Observera att följande tillstånd är kontraindicerade om befintliga (visa produktresumén för Elvanse®, avsnitt 4.3 – Kontraindikationer):	
	Utvärderad
• Känd överkänslighet mot sympatomimetiska aminer, Elvanse® eller mot något av hjälpämnen	☐
• Samtidig behandling med MAO-hämmare eller inom minst 14 dagar efter att dessa läkemedel har satts ut	☐
• Hypertyreos eller tyreotoxikos	☐
• Agitationstillstånd	☐
• Symtomatisk hjärt-kärlsjukdom	☐
• Framskriden åderförkalkning	☐
• Måttlig-svår hypertoni	☐
• Glaukom	☐

Särskilda varningar eller försiktighetsåtgärder:

Överväg även följande innan du påbörjar behandling med Elvanse® ([visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.4 – Varningar och försiktighet](#))

Hereditet (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.4)	
	Utvärderad
• Familjeanamnes med plötslig hjärtdöd/oförklarligt dödsfall	☐
• Familjeanamnes med ventrikulär arytmi	☐
• Familjeanamnes med tics eller Tourettes syndrom	☐
Patientanamnes (inklusive tidigare och nuvarande komorbida medicinska och psykiatriska sjukdomar eller symtom) och fysisk undersökning	
Försiktighet krävs när lisdexamfetamindimesylat förskrivs till patienter med vissa komorbiditeter	

	Utvärderad
Hjärt-kärlsystemet (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.4 – Kardiovaskulära komplikationer)	
• Befintliga hjärt-/kärlsjukdomar, inklusive högt blodtryck, hjärtsvikt, nyligen genomgången hjärtinfarkt, ventrikulär arytm, strukturella hjärtavvikelse, kardiomyopati, allvarliga kardiella arytmier, koronarsjukdom och andra allvarliga hjärtproblem	☐
• Underliggande medicinska tillstånd, som kan förvärras av en ökning av blodtryck eller hjärtfrekvens	☐

	Utvärderad
Psykiatriska/neurologiska sjukdomar (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.4 – Varningar och försiktighet)	
• Befintliga psykiska sjukdomar	☐
• Befintliga psykotiska symtom	☐
• Aggressivt eller fientligt beteende	☐
• Bipolär sjukdom	☐
• Depressiva symtom (screena för risk för bipolär sjukdom genom detaljerad psykisk anamnes inklusive familjeanamnes för självmord, bipolär sjukdom och depression)	☐
• Motoriska eller verbala tics eller Tourettes syndrom	☐
• Förekomst av krampfall. Patienter med anamnes på krampfall eller tidigare EEG-avvikelse i frånvaro av kramper	☐
Graviditet, amning och menstruation (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.6 – Fertilitet, graviditet och amning)	☐
Anamnes på missbruk eller beroende (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.4 – Skadligt substansbruk och beroende) och potential för missbruk, felaktig användning och spridning av lisdexamfetamindimesylat (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.2 – Utvärdering före behandling)	☐
Nedsatt njurfunktion (se produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.2 – Patienter med nedsatt njurfunktion- eller patienter med nedsatt leverfunktion)	☐

Potentiella interaktioner med andra läkemedel	
<i>Försiktighet krävs när Elvanse® förskrivs till patienter vid samtidig användning av vissa läkemedel</i>	
	Utvärderad
Sympatomimetiska läkemedel (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.4 – Användning tillsammans med andra sympatomimetiska läkemedel)	☐
Farmakokinetik (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.5 – Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner)	
• Guanfacin depotberedning	☐
• Venlafaxin depotberedning	☐
Medel och tillstånd som förändrar pH i urinen (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.5 – Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner)	
• Askorbinsyra och andra medel och tillstånd som försurar urin	☐
• Bikarbonat och andra medel och tillstånd som alkaliserar urin	☐
Monoaminoxidashämmare (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.5 – Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner. Monoaminoxidashämmare). Amfetamin ska inte administreras samtidigt med eller inom 14 dagar efter administrering av MAO-hämmare, eftersom detta kan öka frisättningen av noradrenalin och andra monoaminer.	☐
Serotonerga läkemedel (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.5 – Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner. Serotonerga läkemedel). Serotonergt syndrom har förekommit i sällsynta fall i samband med användning av amfetaminer såsom lisdexamfetamindimesylat och när det givits tillsammans med serotonerga läkemedel, inklusive selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI-läkemedel) och serotonin- och -noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-läkemedel). Detta har också rapporterats i samband med överdosering av amfetaminer, inklusive lisdexamfetamindimesylat.	☐
Farmakodynamik (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.5 – Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner)	
• Antihypertensiva läkemedel (inklusive guanetidin eller andra antihypertensiva läkemedel)	☐
• Narkotiska analgetika	☐
• Klorpromazin	☐
• Haloperidol	☐
• Litiumkarbonat	☐

Bipacksedel	
	Utvärderad
Överväg att använda bipacksedel som en guide för att hjälpa dig att förklara behandling av ADHD med Elvanse® för din patient.	☐

Registrera all ytterligare information här

Efter bedömningen ovan, ska du fylla i checklistan som tillhandahålls för att registrera ett utgångsvärde för fortlöpande uppföljning. (klicka här för att se)