

Checklista 1: Checklista för Elvanse® (lisdexamfetamindimesylat) inför förskrivning

Den här checklistan är avsedd att stödja dig med lämplig insättning av Elvanse® hos ett barn med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dvs. uppmärksamhetsstörning med överaktivitet). I åldern sex år och äldre när svar på tidigare behandling med bedöms vara kliniskt otillräckligt.

Såsom anges i produktresumén och produktförskrivningsinformationen, kan specifika samtidiga sjukdomar exkludera användningen av Elvanse® eller motivera särskild uppmärksamhet, inklusive hjärt- och neuropsykiatriska sjukdomar eller symtom. Det rekommenderas att denna checklista används i samband med produktresumén för Elvanse® ([klicka här för att visa](#)). Viktigt:

- Blodtryck (**med användning av kategorier som definierats av American Heart Association**, som anges i Tabell 1 nedan) och hjärtfrekvens (puls) ska journalföras i ett percentildiagram innan behandlingen sätts in, vid varje dosjustering och sedan minst var sjätte månad.
- Längd, vikt och aptit ska journalföras minst var sjätte månad med hjälp av ett tillväxtdiagram
- Utveckling av nyttillkommen eller försämring av redan befintliga psykiska sjukdomar ska övervakas innan behandlingen sätts in, vid varje dosjustering och sedan minst var sjätte månad och vid varje besök

Ladda ner och skriv ut denna checklista före din konsultation. Du kan inte lagra någon patientspecifik information på webbplatsen. Den ifyllda checklistan kan dokumenteras i patientens journal.

När du går igenom checklistan kan det också vara fördelaktigt att diskutera bipacksedeln för Elvanse® ([klicka här för att visa](#)) med din patient och dennes förälder/rar eller vårdnadshavare.

Innan behandling med Elvanse® sätts in

Datum för bedömning:	
Patientens namn:	
Födelsedatum:	
Ålder:	Kön:

Patienter med något av följande tillstånd, komorbiditeter och/eller samtidig läkemedelsbehandling bör inte få Elvanse®:

Kontraindikationer	
Observera att följande tillstånd är kontraindicerade om befintliga (visa produktresumén för Elvanse®, avsnitt 4.3 – Kontraindikationer):	
	Utvärderad
• Känd överkänslighet mot sympatomimetiska aminer, Elvanse® eller något av hjälpämnen	☐
• Samtidig behandling med monoaminoxidashämmare , eller inom minst 14 dagar efter att dessa dessa läkemedel har satts ut	☐
• Hypertyreos eller tyreotoxikos	☐
• Agitationstillstånd	☐
• Symtomatisk hjärt-kärlsjukdom	☐
• Framskriden åderförkalkning	☐
• Måttlig-svår hypertoni	☐
• Glaukom	☐

Speciella varningar eller försiktighetsåtgärder

Överväg även följande innan du påbörjar behandling med Elvanse® ([visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.4 – Varningar och försiktighet](#))

Hereditet (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.4)	
	Utvärderad
• Familjeanamnes med plötslig hjärtdöd/oförklarligt dödsfall	☐
• Familjeanamnes med ventrikulär arytmi	☐
• Familjeanamnes med tics eller Tourettes syndrom	☐

Patientens historik och hälsokontroll	
Försiktighet krävs när Elvanse® förskrivs till patienter med vissa komorbiditeter	
	Utvärderad
Hjärt-kärlsystemet (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.4 – Kardiovaskulära biverkningar)	
• Befintliga hjärt-/kärlsjukdomar, inklusive högt blodtryck, hjärtsvikt, nyligen genomgången hjärtinfarkt, ventrikulär arytmi, strukturella hjärtavvikelser, kardiomyopati, allvarliga kardiella arytmier, koronarsjukdom och andra allvarliga hjärtproblem	☐
• Underliggande medicinska tillstånd, som kan förvärras av en ökning av blodtryck eller hjärtfrekvens	☐

	Utvärderad
Psykiatriska/neurologiska sjukdomar (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.4 – Varningar och försiktighet)	
• Befintliga psykiatriska sjukdomar	☐
• Befintliga psykotiska symtom	☐
• Aggressivt eller fientligt beteende	☐
• Bipolär sjukdom	☐
• Depressiva symtom (screena efter risk för bipolär sjukdom genom detaljerad psykiatrisk anamnes, inklusive familjär familjeanamnes för självmord, bipolär sjukdom och depression)	☐
• Motoriska eller verbala tics eller Tourettes syndrom	☐
• Förekomst av krampanfall. Patienter med anamnes på krampanfall eller tidigare EEG-avvikelser i frånvaro av kramper	☐
Graviditet, amning och menstruation (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.6 – Fertilitet, graviditet och amning)	☐
Anamnes på missbruk eller beroende (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.4 – Skadligt substansbruk och beroende) och potential för missbruk, felaktig användning och spridning av lisdexamfetamindimesylat (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.2 – Utvärdering före behandling)	☐
Nedsatt njurfunktion (se produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.2 – Patienter med nedsatt njurfunktion patienter med nedsatt leverfunktion)	☐

Potentiella interaktioner med andra läkemedel	
<i>Försiktighet krävs när Elvanse® förskrivs till patienter vid samtidig användning av vissa läkemedel</i>	
	Utvärderad
Sympatomimetiska läkemedel (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.4 – Användning tillsammans med andra sympatomimetiska läkemedel)	☐
Farmakokinetik (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.5 – Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner)	
• Guanfacin depotberedning	☐
• Venlafaxin depotberedning	☐
Medel och tillstånd som förändrar pH i urinen (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.5 – Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner)	
• Askorbinsyra och andra medel och tillstånd som försurar urinen	☐
• Bikarbonat och andra medel och tillstånd som alkaliserar urin	☐
Monoaminoxidas (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.5 – Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner Monoaminoxidashämmare). Amfetamin ska inte administreras samtidigt med eller inom 14 dagar efter administrering av MAO-hämmare, eftersom detta kan öka frisättningen av noradrenalin och andra monoaminer	☐
Serotonerga läkemedel (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.5 – Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner. Serotonerga läkemedel). Serotonergt syndrom har i sällsynta fall förekommit i samband med användning av amfetaminer såsom Elvanse vid samtidig administrering med serotonerga läkemedel, inklusive selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI-preparat) och serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat). Det har även rapporterats i samband med överdosering av amfetaminer, inklusive Elvanse (se avsnitt 4.9).	☐
Farmakodynamik (visa produktresumén för Elvanse® avsnitt 4.5 – Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner)	
• Antihypertensiva läkemedel (inklusive guanetidin eller andra antihypertensiva läkemedel)	☐
• Narkotiska analgetika	☐
• Klorpromazin	☐
• Haloperidol	☐
• Litiumkarbonat	☐

Patientinformationsblad	
	Utvärderad
Överväg att använda bipacksedeln som en guide för att hjälpa dig att förklara behandlingen av ADHD med Elvanse® för din patient och dennes förälder/-rar eller vårdnadshavare	☐

Registrera all ytterligare information här

Efter bedömningen ovan, ska du fylla i checklistan som tillhandahålls för att registrera ett utgångsvärde för fortlopande uppföljning. (klicka här för att se).