

## Natriumoxibat Kalceks

### VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FÖR PATIENTER:

#### Gör

- Ha alltid detta kort med dig.
- Visa detta kort för läkare och apotekspersonal involverade i din behandling.
- Ta med dig en lista över alla dina läkemedel när du besöker läkare eller apotek.
- Tala omedelbart om för din läkare om du upplever ovanliga symptom som till exempel konstiga tankar, inklusive tankar på att skada andra, medan du tar Natriumoxibat Kalceks.
- Förvara Natriumoxibat Kalceks utom syn- och räckhåll för barn.

### Datum då Natriumoxibat Kalceks först förskrivits

#### KONTAKTINFORMATION

Patientens namn: .....

Patientens telefonnummer: .....

Namn på närmast anhörig: .....

Telefon till närmast anhörig: .....

Namn på behandlande läkare: .....

Telefon till behandlande läkare: .....

Telefonnummer för akut medicinsk assistans: .....

### VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FÖR PATIENTER:

Natriumoxibat Kalceks, kan sänka din andning och medvetandegrad.

#### **GÖR INTE** något av följande:

- Drick **INTE** alkohol medan du behandlas med Natriumoxibat Kalceks.
- Ta **INTE** mer än den dos din läkare förskrivit.
- Kör **INTE** bil eller använd tunga maskiner inom 6 timmar efter att du tagit Natriumoxibat Kalceks.
- Ta **INTE** några andra läkemedel utan att ha diskuterat dem med din läkare.
- Dela **INTE** Natriumoxibat Kalceks med någon annan.

Om du du tagit för stor mängd av Natriumoxybat Kalceks (eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag) måste du få akut medicinsk hjälp direkt. Symtom på överdosering av natriumoxibat är bland annat upprördhet, förvirring, nedsatt rörlighet, nedsatt andning, dimsyn, kraftig svettning, huvudvärk, kräkningar, sänkt medvetandenivå som leder till koma och anfall, överdriven törst, muskelkramper och svaghet.

### VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FÖR LÄKARE/APOTEKARE

Denna patient tar Natriumoxibat Kalceks för behandling av narkolepsi med kataplexi.

Natriumoxibat Kalceks kan orsaka andningsdepression, hämning av CNS, epileptiska anfall, psykos, depression och självmordsbenägenhet.

Opioider eller barbiturater bör inte användas tillsammans med Natriumoxibat Kalceks. Andra CNS-hämmande läkemedel och läkemedel som kan ge andningsdepression bör undvikas. Var särskilt försiktig vid användning av topiramat och valproat tillsammans med Natriumoxibat Kalceks.

Natriumoxibat Kalceks är potentiellt missbruks- och beroendeframkallande

Vänligen läs produktresumén för Natriumoxibat Kalceks innan förskrivning/ dispensering av andra läkemedel till denna patient.