

## **PATIENTINFORMATIONSKORT**

Dabigatran etexilate Teva 75 mg hårda kapslar  
Dabigatran etexilate Teva 110 mg hårda kapslar  
Dabigatran etexilate Teva 150 mg hårda kapslar  
dabigatranetexilat

- Du/vårdaren ska alltid ha med detta patientinformationskort.
- Se till att det är den senaste versionen

### **Bästa patient/vårdare av en pediatrik patient**

Du/ditt barn har nu börjat behandlas med Dabigatran etexilate Teva. För att kunna använda Dabigatran etexilate Teva på ett säkert sätt bör du läsa den viktiga informationen i bipacksedeln.

Detta informationskort innehåller viktig information om din/ditt barns behandling. Se därför till att du/ditt barn alltid har med det. Informera vårdpersonal om att du/ditt barn använder Dabigatran etexilate Teva.

### **Information om Dabigatran etexilate Teva för patienter/vårdare av pediatrika patienter**

Om din/ditt barns behandling

- Dabigatran etexilate Teva tunnar ut blodet. Det används för att behandla befintliga blodproppar eller förhindra att farliga blodproppar bildas.
- Följ din/ditt barns läkares anvisningar när du tar Dabigatran etexilate Teva. Hoppa aldrig över en dos och sluta inte ta/ge Dabigatran etexilate Teva utan att först prata med din/ditt barns läkare.
- Informera din/ditt barns läkare om alla läkemedel som du/ditt barn tar.
- Informera läkaren om att du/ditt barn tar Dabigatran etexilate Teva innan du/ditt barn ska genomgå en operation eller andra ingrepp.
- Dabigatran etexilate Teva kapslar kan tas med eller utan mat. Kapseln ska sväljas hel med ett glas vatten. Kapseln får inte brytas sönder eller tuggas och kornen får inte tömmas ut från kapseln.
- 

När du bör uppsöka läkare

- Blödningsrisken kan öka när du tar Dabigatran etexilate Teva. Kontakta genast läkare om du/ditt barn upplever tecken och symtom på blödning såsom svullnad, obehag, ovanlig smärta eller huvudvärk, yrsel, blekhet, svaghet, ovanliga blåmärken, näsblod, blödning i tandköttet, ovanligt långvarig blödning vid skärsår, onormalt mensflöde eller blödning från slidan, blod i urinen som kan vara rosa eller brun, röd/svart avföring, blodiga upphostningar, blodiga kräkningar eller kräkningar som liknar kaffesump.
- Vid fall eller skada, framför allt om huvudet skadas, kontakta genast läkare.
- Sluta inte att ta Dabigatran etexilate Teva utan att först prata med din/ditt barns läkare, om du/ditt barn upplever halsbränna, illamående, kräkningar, magbesvär, uppsvälld mage eller smärta i övre delen av buken.

### **Information om Dabigatran etexilate Teva för vårdpersonal**

- Dabigatran etexilate Teva är ett oralt antikoagulantium (direkt trombinhämmare).
- Behandlingen med Dabigatran etexilate Teva kan behöva avbrytas inför en operation eller annat ingrepp.
- Om större blödningshändelser uppstår måste behandlingen med Dabigatran etexilate Teva avbrytas omedelbart.
- Ett specifikt reverserande läkemedel (idarucizumab) finns tillgängligt för vuxna patienter. Effekt och säkerhet för det specifika reverserande läkemedlet, idarucizumab, har inte fastställts hos pediatrika patienter. För mer information och ytterligare råd om hur den antikoagulerande effekten av Dabigatran etexilate Teva kan motverkas se produktresumén för Dabigatran etexilate Teva och idarucizumab.
- Dabigatran etexilate Teva utsöndras huvudsakligen via njurarna; adekvat diures måste upprätthållas. Dabigatran etexilate Teva kan dialyseras.

### **Fyll i denna del eller be din/ditt barns läkare att göra det** **Patientinformation**

---

Patientens namn

---

Födelsedatum

---

Indikation för antikoagulation

---

Dos av Dabigatran etexilate Teva