
Telefonnummer till behandlande läkare:

Namn på behandlande läkare:

Klinikens namn:

Första förskrivningsdatum:

Patientens namn:

TERIFLUNOMIDE VIATRIS (TERIFLUNOMID) PATIENTKORT

Detta material innehåller viktig säkerhetsinformation om Teriflunomide Viatris (teriflunomid) och råd om riskminimering. Läs även bipacksedeln för fullständig information.

Visa detta kort för läkare och annan vårdpersonal som är involverade i din medicinska behandling (t.ex vid olycksfall).

Detta patientkort har tagits fram av Viatris Company.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Du kan också rapportera biverkningar direkt via www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Om du har frågor om produkten kan du kontakta medicinsk information på Viatris via email info.sweden@viatris.com eller via telefonnummer +46 8 630 19 00.



Viktiga biverkningar

Detta läkemedel kan påverka leverns funktion, ditt blodtryck och vissa celler i blodet som är viktiga för att bekämpa infektioner.

Kontakta din läkare omedelbart om du har någon av följande biverkningar:

- Din hud eller ögon gulfärgas (gulsot), oförklarad illamående eller kräkningar, buksmärta eller mörkare urin än vanligt. Detta kan vara symptom på problem med levern.
- Tecken på en infektion, inklusive smärtsamt urinflöde, förvirring, hög kroppstemperatur (feber), frossa, hosta, svullna körtlar.

För kvinnor i fertil ålder, inklusive flickor och deras föräldrar/vårdnadshavare

- Teriflunomid kan orsaka missbildningar av fostret om det tas under graviditet och ska därför inte tas av gravida eller personer som planerar eller riskerar kan bli gravida.
- Börja inte med teriflunomid när du är gravid eller om du tror att du kan vara gravid. Din läkare kan be om ett graviditetstest för att bekräfta.
- Använd ett tillförlitligt preventivmedel under hela behandlingen med teriflunomid, samt efter till dess att nivån av läkemedlet i blodet är låg. Din läkare kommer att informera dig om potentiella risker för ett foster och behovet av preventivmedel.
- Kontakta din läkare om du vill byta preventivmedel eller om du planerar att bli gravid, inklusive efter avslutad behandling med teriflunomid.
- Om du blir gravid, eller om du misstänker att du är gravid medan du tar teriflunomid, sluta att ta teriflunomid och kontakta din läkare omedelbart.
- Vid graviditet under eller upp till två år efter avslutad teriflunomidbehandling kan din läkare föreslå behandling med läkemedel för att påskynda avlägsnandet av teriflunomid i din kropp, då detta kan minska risken för fostret.
- Du ska även diskutera med din läkare om du ammar eller planerar att amma.
- Till föräldrar/vårdnadshavare eller behandlade flickor: kontakta behandlande läkare när patienten får första menstruationen för att få rådgivning om den potentiella risken för fostret och behovet av tillförlitligt preventivmedel.

Version 2.0 / FEB-2025

Detta utbildningsmaterial uppfyller villkoren för försäljning för Teriflunomide Viatriis