

## INJEKTIONSGUIDE

**Denna bruksanvisning är för dig som får behandling med IMULDOSA eller för dig som är förälder/vårdnadshavare och ska ge Imuldosa till ett barn.**

IMULDOSA förfylld injektionsspruta som innehåller den monoklonala antikroppen ustekinumab. Imuldosa tillhör en grupp läkemedel som kallas för *immunsuppressiva medel* och verkar genom att hämma en del av immunförsvaret.

**IMULDOSA används för att behandla följande inflammatoriska sjukdomar:**

- Måttlig till svår Crohns sjukdom hos vuxna
- Plackpsoriasis hos vuxna och barn från 6 år och äldre
- Psoriasisartrit hos vuxna

Innan du injicerar läkemedlet behöver du ha tränat på injektionstekniken tillsammans med läkare eller sjuksköterska.

Använd Imuldosa exakt enligt läkares anvisningar. Om du glömmer att ta en dos, kontakta läkare eller apotekspersonal. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

**Rådfråga läkare om du har några frågor om hur du ska injicera. För fullständig information om IMULDOSA, läs bipacksedeln noga på [www.fass.se](http://www.fass.se)**



Scanna QR-koden för att se en instruktionsfilm.



## FÖRVARING

- Förvara IMULDOSA i kylskåp (2°C–8°C), utom syn- och räckhåll för barn. Förvara sprutan i ytterkartongen (ljuskänslig). Får ej frysas.
- Vid behov kan enskilda IMULDOSA förfyllda sprutor även förvaras i rumstemperatur (i sin ytterkartong) vid högst 30°C under en period på upp till 30 dagar. En spruta som förvarats i rumstemperatur vid högst 30°C ska inte läggas tillbaka i kylen. Kassera sprutan om den inte används inom 30 dagar eller när det ursprungliga utgångsdatumet har passerat, beroende på vilket som inträffar först.
- Förfyllda sprutor med Imuldosa får inte skakas. Om läkemedlet skakas kraftigt under en längre tid kan det förstöras.

## BRUKSANVISNING

### Kontrollera antalet sprutor och förbered materialet


- Ta ut det antal förfyllda sprutor du behöver ur kylskåpet. Låt den förfyllda sprutan vara utanför kartongen i ungefär 30 minuter. På så sätt får vätskan en temperatur som är behagligare att injicera (rumstemperatur). Ta inte bort nålskyddet på sprutan medan den antar rumstemperatur
- Håll den förfyllda sprutan i cylindern, den täckta nålen ska peka uppåt.

- Håll inte i kolvstoppet, kolven, vingarna för nålskyddsanordningen eller nålskyddet.
- Dra aldrig kolven bakåt.
- Ta inte bort nålskyddet från den förfyllda sprutan innan du instrueras att göra det.
- Rör inte klämmorna för aktivering av nålskyddsanordningen detta för att förhindra att nålen täcks av nålskyddsanordningen för tidigt.

### Kontrollera de förfyllda sprutorna för att säkerställa följande

- att antalet förfyllda sprutor och styrka stämmer
- om din dos är 45 mg får du en förfylld spruta med 45 mg IMULDOSA
- om din dos är 90 mg får du en förfylld spruta med 90 mg IMULDOSA
- att det är rätt läkemedel och att inte utgångsdatumet har passerat
- att den förfyllda sprutan inte är skadad
- att vätskan i den förfyllda sprutan är färglös till svagt gulaktig och klar till lätt opalescent
- att vätskan i den förfyllda sprutan inte är missfärgad eller grumlig och inte innehåller främmande partiklar
- att vätskan i den förfyllda sprutan inte är fryst

forts. →



Så här ser den förfyllda sprutan ut.




**IMULDOSA®**  
ustekinumab

## Välj injektionsställe

Plocka ihop allt material du behöver och lägg det på en ren yta. Detta innefattar antiseptiska servetter, bomull eller gaskompress och en riskavfallsbehållare.

- IMULDOSA injiceras under huden (subkutan).
- Lämpliga injektionsställen är på övre delen av låret eller på magen minst 5 cm från naveln.
- Undvik om möjligt hudområden som visar tecken på psoriasis.
- Om någon hjälper dig med injektionen kan denna person även välja överarm som injektionsställe.



Gråmarkerade områden visar rekommenderade injektionsställen.

## Förebred injektionsstället

- Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten.
- Torka av huden vid injektionsstället med en antiseptisk servett.
- Rör därefter inte området igen före injektionen.

## Ta bort nålskyddet (se bild 2)

- Håll sprutan i ena handen med nålens ände pekande bort från dig och utan att vidröra kolvstängan.
- Dra nålskyddet rakt ut med den andra handen.
- Kasta nålskyddet i en behållare för vassa föremål.
- Du kan märka en luftbubbla i den förfyllda sprutan eller en droppe vätska vid nålens spets. Båda dessa fynd är normala och behöver inte avlägsnas.
- Rör inte nålen och låt den inte vidröra någon yta.
- Använd inte den förfyllda sprutan om du tappar den utan att nålskyddet är på plats. Om detta händer, kontakta din läkare eller apotekspersonal.
- Injicera dosen omedelbart efter att nålskyddet avlägsnats.




Bild 2

## Injicera dosen

- Håll den förfyllda sprutan med ena handen mellan långfingret och pekfingret och placera tummen på kolvstoppet. Använd den andra handen till att försiktigt lyfta upp den rengjorda huden mellan tummen och pekfingret, utan att klämma ihop den hårt.
- Dra aldrig kolven bakåt.
- Med en snabb rörelse förs nålen in i huden så långt som möjligt (se bild 3).



Bild 3

- Injicera hela läkemedelsdosen genom att trycka på kolven till dess att kolvstoppet är placerat mellan vingarna för nålskyddsanordningen (se bild 4).



Bild 4

- När kolven inte kan tryckas ner längre ska du fortsätta att hålla kolvstoppet nertryckt och ta ut nålen och släppa greppet om huden (se bild 5).




Bild 5

- Ta sakta bort tummen från kolvstoppet för att låta den tomma sprutan att röra sig uppåt till dess att hela nålen är täckt av nålskyddsanordningen, som visas i bild 6.




Bild 6

## Efter injektionen

- Tryck på injektionsstället i några sekunder med en antiseptisk servett efter injektionen.
- Det kan förekomma en liten mängd blod eller vätska på injektionsstället. Detta är normalt.
- Du kan pressa en bomullstuss eller en gaskompress mot injektionsstället i 10 sekunder.
- Gnugga inte på huden vid injektionsstället. Du kan täcka injektionsstället med ett litet plåster om det behövs.

## KASSERA SPRUTAN

- Kassera använda sprutor i en punkterings-säker behållare, t.ex. en riskavfallsbehållare (se bild 7). Återanvänd aldrig en spruta, för din säkerhet och hälsa och för andras säkerhet. Gör dig av med riskavfallsbehållaren enligt lokala anvisningar.
- Antiseptiska servetter och övrigt material kan kastas som vanligt hushållsavfall.



Bild 7

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

IMULDOSA® (ustekinumab), läkemedel i lösning i förfylld spruta eller koncentrat till infusionsvätska.

IMULDOSA används för att behandla följande inflammatoriska sjukdomar: plackpsoriasis hos vuxna och barn 6 år och äldre; psoriasisartrit hos vuxna samt måttlig till svår Crohns sjukdom hos vuxna.

Använd inte IMULDOSA om du är allergisk mot ustekinumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel eller om du har en aktiv infektion som läkaren anser vara betydelsefull.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder IMULDOSA. Berätta om du har några andra sjukdomar före varje behandling. Tala även om för läkaren om du nyligen varit i kontakt med någon som kan ha haft tuberkulos. Imuldosa bör undvikas vid graviditet och amning.

IMULDOSA kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive allergiska reaktioner och infektioner. Du måste vara uppmärksam på vissa tecken på sjukdom när du tar IMULDOSA. Se ”Allvarliga biverkningar” i avsnitt 4 i bipacksedeln för en fullständig förteckning över dessa biverkningar.

**Läs alltid bipacksedeln noga.**

SE-AI-Uste-01408