



Injexate (metotrexat) 50 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld injektor. Övriga immunsuppressiva medel. Rx. F. L04AX03.

Indikationer: 1. Behandling av aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter. 2. Behandling av polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit, när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) gett inadekvat svar. 3. Behandling av svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer såsom fototerapi, PUVA och retinoider, och svår psoriasisartrit hos vuxna patienter. 4. Behandling av lindrig till måttlig Crohns sjukdom, antingen ensamt eller i kombination med kortikosteroider, hos vuxna patienter refraktära eller intoleranta mot tiopuriner.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot metotrexat eller något av hjälpämnena natriumklorid, natriumhydroxid, svår leverinsufficiens, alkoholmissbruk, svårt nedsatt njurfunktion, befintlig blod dyskrasi, allvarliga akuta eller kroniska infektioner, sår i munhålan och känd aktiv magsårssjukdom, graviditet och amning, samtidig vaccinering med levande vacciner.

Varningar och försiktighet: Patienter måste få tydlig information om att behandlingen ska administreras en gång i veckan, inte varje dag. Patienter som får behandling bör övervakas på lämpligt sätt så att tecken på toxiska effekter eller biverkningar kan upptäckas och bedömas med minsta tänkbara dröjsmål. Därför ska metotrexat endast administreras av, eller under överinseende av, läkare med kunskaper om och erfarenhet av användning av behandling med antimetaboliter. På grund av risken för allvarliga eller till och med dödliga toxiska reaktioner bör patienten få fullständig information av läkaren om de risker som finns och de rekommenderade säkerhetsåtgärderna. Användning till barn <3 år rekommenderas inte på grund av otillräckliga data avseende säkerhet och effekt för denna population.

Fertilitet, graviditet och amning: Kvinnor får inte bli gravida medan de behandlas med metotrexat och effektiva preventivmetoder måste användas under behandling med metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling. Sexuellt aktiva manliga patienter eller deras kvinnliga partners bör använda tillförlitliga preventivmetoder under den manliga patientens behandling och i minst 6 månader efter avslutad behandling. Amning måste avbrytas före och under administrering.

Dosering: Viktig varning angående doseringen av Injexate (metotrexat): Vid behandling av reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, psoriasis och Crohns sjukdom får Injexate (metotrexat) endast användas **en gång i veckan**. Doseringsfel vid användning av Injexate (metotrexat) kan medföra allvarliga biverkningar och även leda till dödsfall. Läs detta avsnitt i produktresumén mycket noga.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se: www.fass.se. Datum för senast uppdaterade SPC: 2021-12-14.

Accord Healthcare AB, Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna, www.accord-healthcare.com/se

SE-01654

accord
Autoimmune

Accord Healthcare AB
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna, Sweden

Tel: +46 8 624 00 25
sweden@accord-healthcare.com



www.accord-healthcare.com/se

SE-01715 2024-01-16

Injexate[®]
metotrexat

INJEKTIONSGUIDE FÖR PATIENTER



accord
Autoimmune

DU HAR FÅTT DENNA INFORMATIONSBROSCHYR AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA

RESA MED INJEXATE

Om du ska resa med flyg, bör din läkare fylla i resecertifikatet ovan.
Du kan förvara Injexate i handbagaget.

Injexate[®]
metotrexat

DETTA ÄR INJEXATE® (METOTREXAT)

Injexate är en förfylld injektor som innehåller metotrexat lösning.

Metotrexat är ett cytostatikum (cellgift) som räknas till gruppen sjukdomsmodifierande läkemedel eller DMARDs (Disease Modifying AntiRheumatic Drugs). Metotrexat används bland annat för behandling av inflammatoriska sjukdomar såsom reumatoid artrit, psoriasis och Cronhs sjukdom. Behandlingen verkar genom att hämma inflammationen och därigenom bromsa sjukdomsförloppet.

Metotrexat är ett välbeprövat läkemedel. Behandlingen kombineras ofta med andra läkemedel för att förstärka effekten vid olika inflammatoriska sjukdomstillstånd.

I denna broschyr får du lära dig hur du injicerar Injexate (metotrexat) lösning. Om du är osäker på hur du ska göra eller har andra frågor, tveka inte att fråga din läkare eller sjuksköterska om hjälp.

För fullständig information om Injexate, läs **bipacksedeln** som finns inuti förpackningen eller på www.fass.se

Injexate® förfylld injektor

BRUKSANVISNING

Viktig information!

Injexate förfylld injektor med metotrexat lösning tas som en injektion subkutan (under huden).

Injexate förfylld injektor doseras **endast en gång per vecka**. Det är viktigt att välja en bestämd veckodag.

Fyll i din veckodag här
och utanpå din läkemedelsförpackning.

För fullständig information om Injexate, läs **bipacksedeln** som finns inuti förpackningen eller på www.fass.se.



Scanna QR kod för
Injexate® instruktionsfilm.
Finns på
www.medicininstruktioner.se



Viktig varning angående doseringen

av Injexate: Vid behandling av reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, psoriasis och Crohns sjukdom får Injexate **endast användas en gång i veckan**. Användning av för stor mängd Injexate (metotrexat) kan vara livshotande. Läs avsnitt 3 i bipacksedeln mycket noga. Om du har några frågor, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder läkemedlet.

Denna injektionsguide ersätter inte den information som finns i bipacksedeln.

Innan du injicerar själv behöver du ha tränat på injektionstekniken tillsammans med läkare eller sjuksköterska.

Injexate förfylld injektor ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn och vid en temperatur under 30°C. Förvara injektorn i ytterkartongen för att skydda läkemedlet från ljus.

Kontrollera utgångsdatumet på förpackningen eller på injektorn. Använd inte injektorn om utgångsdatumet har passerats.

RAPPORTERA BIVERKNINGAR

Om du får några biverkningar, tala direkt med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller alla typer av biverkningar, även sådana som inte står i bipacksedeln. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

FÖRBEREDELSE

Välj en ren, väl upplyst och plan arbetsyta. Ta fram de saker du behöver innan du börjar: *En förfylld injektor och en sprittork.*

Tvätta händerna

Tvätta händerna noga med tvål och vatten.

Välj injektionsställe

På buken eller låret om du injicerar själv, alternativt på baksidan av överarmen om du får hjälp av sjukvårdspersonal.



Byt injektionsställe för varje injektion för att minska risken för irritation vid injektionsstället.

Injicera aldrig i hud som är öm, har blåmärken, är röd, hård, ärrad eller där du har bristningar. Om du har psoriasis ska du försöka att inte injicera direkt i upphöjda, tjocka, röda eller fjälliga hudfläckar eller hudskador.

FÖRE INJEKTIONEN

Rengör injektionsstället

Torka rent med en sprittork och låt området lufttorka i minst 60 sekunder.



Inspektera vätskan genom fönstret

Kontrollera att det inte förekommer förändringar i färg, grumlighet eller stora partiklar.



Ta bort det genomskinliga locket

Vrid och dra bort locket. Undvik att låta händerna komma nära nålskyddet när du har tagit bort locket. Sätt inte tillbaka locket, utan kassera det omedelbart. Injicera inte om du tappar den förfyllda injektorn efter att du har tagit bort locket.

Injicera inom 5 minuter efter att du har tagit bort locket.

INJICERA LÖSNINGEN

■ Placera injektorn rakt på huden med cirka 90 graders vinkel.

■ Tryck det vita handtaget rakt ned. Gör detta med en hastighet som känns bekväm för dig. Läkemedlet injiceras när du trycker.

■ Lyft inte upp injektorn under injektionen.

■ Injektionen är avslutad när du har tryckt ned det vita handtaget så långt det går, du hör ett klickljud och den orangefärgade delen av injektorn inte längre syns.

■ Lyft rakt upp: Det gula bandet indikerar att nålskyddet är låst.



KASSERING & HANTERING

Kassera använd Injexate förfylld injektor:

Omedelbart efter att injektorn använts ska den kasseras i en behållare godkänd för vassa föremål. Hantering och kassering måste överensstämja med den för andra cytostatika i enlighet med lokala krav. Förfarandena varierar mellan olika områden. Fråga läkare eller apotekspersonal om korrekta instruktioner för kassering. **Kasta inte injektorn i hushållsavfallet.**

Metotrexat bör inte komma i kontakt med ytor på hud eller slemhinnor. Om detta händer, skölj omedelbart området med vatten i rikliga mängder. Om du eller någon i din närhet skadas av nålen, använd inte den förfyllda injektorn, utan kontakta läkare omedelbart. Gravid sjukvårdspersonal ska inte hantera och/eller administrera Injexate förfylld injektor.