

Agomelatin Glenmark

REKOMMENDATIONER FÖR ATT UNDVIKA LEVERBIVERKNINGAR

Agomelatin Glenmark kan ge biverkningar som kan påverka leverfunktionen.

I detta informationsblad ges rekommendationer för att undvika leverbiverkningar samt råd om vad du ska göra om sådana biverkningar uppkommer under behandlingen med Agomelatin Glenmark. Rådgör med läkare för ytterligare information.

Agomelatin Glenmark är ett antidepressivt läkemedel som används vid behandling av depression. För att uppnå ett bra behandlingsresultat, följ läkarens rekommendationer för hur du ska ta Agomelatin Glenmark (dosering, behandlingens längd, läkarbesök för uppföljning, blodprovstagningar).

INNAN DU PÅBÖRJAR EN BEHANDLING MED AGOMELATIN GLENMARK

- Ta inte Agomelatin Glenmark:
 - Om din lever inte fungerar ordentligt (nedsatt leverfunktion).
 - Om du är allergisk mot agomelatin eller något annat innehållsämne i dessa tabletter.
 - Om du tar fluvoxamin (ett annat läkemedel för behandling av depression) eller ciprofloxacin (ett antibiotikum).
- Det kan även finnas orsaker till att Agomelatin Glenmark inte är lämplig för dig. Rådgör med läkare i följande situationer:
 - Om du tar läkemedel som man vet påverkar levern.
 - Om du har fetma eller är överviktig.
 - Om du har diabetes.
 - Om du har förhöjda nivåer av leverenzymmer före behandling.
 - Om du har bipolär sjukdom, har haft eller om du utvecklar maniska symtom (en period med onormal hög retbarhet och känslsamhet).
 - Om du lider av demens kommer din läkare att göra en individuell bedömning om det är lämpligt för dig att ta Agomelatin Glenmark.



VAD BEHÖVER DU GÖRA FÖR ATT UNDVIKA PROBLEM MED LEVERN UNDER BEHANDLINGEN?

► Ta blodprover regelbundet

• Varför?

Din läkare ska ha kontrollerat att din lever fungerar ordentligt innan behandlingen påbörjas. Blodproverna, som visar hur din lever fungerar, ligger till grund för läkarens beslut om behandling med Agomelatin Glenmark är lämplig för dig.

Vissa patienter kan få förhöjda nivåer av leverenzymmer i sitt blod vid behandling med Agomelatin Glenmark. Baserat på utvärderingen av dessa tester kommer läkaren att bedöma om du ska fortsätta använda Agomelatin Glenmark.

• När?

	Före start eller dosökning	Efter ca 3 veckor	Efter ca 6 veckor	Efter ca 12 veckor	Efter ca 24 veckor
Blodprover	✓	✓	✓	✓	✓

Om läkaren ökar dosen till 50 mg, måste nya blodprover tas.

Kom ihåg att ta med dig din **KOM-IHÅG-LISTA FÖR BLODPROVSTAGNINGARNA** vid läkarbesöken (se nästa sida).

Tala omedelbart om för läkaren om dina leverenzymnivåer ökar under behandlingen.

► Var uppmärksam på tecken och symtom på att levern inte fungerar ordentligt

Om du observerar några av dessa tecken och symtom på leverproblem: ovanligt mörk urin, ljus avföring, gul hud/gula ögon, smärta i övre, högra delen av buken, onormal trötthet (speciellt i samband med andra symtom som anges ovan), rådfråga omedelbart läkare som kan uppmana dig att sluta ta Agomelatin Glenmark.

KOM IHÅG-LISTA ÖVER DATUMEN FÖR DINA BLODPROVSTAGNINGAR

När du tar Agomelatin Glenmark är det viktigt att blodprover tas med vissa intervaller. ANVÄND DENNA TABELL FÖR ATT HA KONTROLL PÅ DATUM FÖR BLODPROVSTAGNINGARNA.

AGOMELATIN GLENMARK 25 MG DATUM FÖR FÖRSTA DOSERING: _____	
Blodprovstagning av leverenzymmer	Datum
Första provtagning (vid start)	
Andra provtagning (efter ca 3 veckor)	
Tredje provtagning (efter ca 6 veckor)	
Fjärde provtagning (efter ca 12 veckor)	
Femte provtagning (efter ca 24 veckor)	

Läkaren avgör om ytterligare blodprover behöver tas.

DOSÖKNING TILL 50 MG DATUM FÖR FÖRSTA DOSERING: _____	
Blodprovstagning av leverenzymmer	Datum
Första provtagning (vid start)	
Andra provtagning (efter ca 3 veckor)	
Tredje provtagning (efter ca 6 veckor)	
Fjärde provtagning (efter ca 12 veckor)	
Femte provtagning (efter ca 24 veckor)	

Läkaren avgör om ytterligare blodprover behöver tas.

Läkaren kommer att övervaka dina blodprover enligt ett provtagningsformulär för levervärden. Kom ihåg att ta med detta formulär vid läkarbesöken.

För ytterligare information, läs bipacksedeln i Agomelatin Glenmark förpackningen.