

Risk för cancer

RINVOQ kan potentiellt öka risken att utveckla cancer, särskilt hudcancer.

Informera din läkare om du uppmärksammar någon förändring i utseendet av huden eller upptäcker en ny tillväxt på huden.

Risk för hål i tarmen

RINVOQ kan öka risken för hål i tarmen, särskilt om du har Crohns sjukdom. Berätta för din läkare omedelbart om du upplever oförklarlig eller oväntad smärta i magen (buken).

Visa detta kort för hälso- och sjukvårdspersonal som medverkar i din vård och behandling – till exempel din tandläkare eller en akutvårdsläkare.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Du kan hjälpa till genom att rapportera biverkningar till www.lakemedelsverket.se.

Ditt namn:

Läkarens namn – som ordinerat RINVOQ:

Läkarens telefonnummer:

Datumet du påbörjade behandlingen:

Granskad av Läkemedelsverket 21 april 2023.
SE-UPAD-190021 v4.0 april 2023
www.rinvoq.eu www.fass.se



abbvie

Patientkort

Du (eller din vårdgivare) ska alltid ha med sig detta kort

Säkerhetsinformation om RINVOQ® (upadacitinib) för patienter

- Det här kortet innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste känna till före och under behandling med RINVOQ.
- Läs bipacksedeln för mer information.

Risk för infektion

RINVOQ kan göra en pågående infektion värre eller öka risken för att du får en ny infektion, till exempel tuberkulos (TB), bältros eller hepatitinfektion.

Informera omedelbart din läkare om du får tecken på en infektion, till exempel:

- Feber, svettningar, frossa, viktnedgång eller hosta som inte går över – detta kan vara tecken på TB.
- Smärtsamt hudutslag med blåsor – detta kan vara tecken på bältros.
- Trötthetskänsla eller andfåddhet – detta kan vara tecken på lunginflammation.

Vacciner – används för att förhindra infektioner

Levande vacciner (t.ex. vaccin mot gula febern, mässling, påssjuka, röda hund, vattkoppor, tuberkulos (BCG) och vissa vacciner mot bältros) ska inte ges under behandling med RINVOQ eller omedelbart före behandling med RINVOQ.

Tala med din läkare innan du får några vacciner – de vet vilka vacciner du inte ska ta innan eller under behandling med RINVOQ.

Risk för hjärtsjukdom

Behandling med RINVOQ kan förknippas med förhöjt kolesterol (blodfetter). Din läkare kommer därför

kontrollera dina kolesterolnivåer när du tar RINVOQ.

Informera din läkare omedelbart om du får några symtom såsom smärta och tryckkänsla i bröstet eftersom detta kan vara tecken på hjärtsjukdom.

Preventivmedel, graviditet och amning

RINVOQ ska inte användas om du är gravid.

- Använd ett effektivt preventivmedel medan du tar RINVOQ och i 4 veckor efter den sista dosen. Tala med din läkare om effektiva preventivmedel.
- Informera din läkare omedelbart om du vill bli eller blir gravid.
- Amma inte när du tar RINVOQ.

Risk för blodproppar i vener eller lungor

Blodproppar i vener och lungor har observerats med RINVOQ. Sök läkare omedelbart om du får tecken på blodproppar i vener eller lungor, såsom plötslig andfåddhet, en smärtsam svullnad i ben eller bröstsmärta.